

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元丙集二卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國 校  
龔安國

南雍太學生龔印周文卿光霽堂刻

痰飲

脉雙弦者寒飲也。○其脉偏弦者飲也。○肺飲不弦但喘短氣。○又云脉浮而細滑傷飲。○脉弦數有寒飲春夏難治。○脉沉而弦者懸飲內積。○其人短氣四肢歷節走痛脉沉者有間飲。○左右手關前脉浮弦大而胃脘上有稠痰也宜吐之。○病人百藥不効關上脉伏而大者痰也。眼胞及眼下如炭烟熏黑者亦痰也。○久得滑脉痰飲膠固脉道阻滯也卒難得開必費調理。

痰者病名也。生於脾胃。然脾胃氣盛。飲食易化。何痰之有。或食後因之氣  
惱勞碌。驚恐風邪。致飲食之精華。不能傳化。而成痰飲。失有流于經絡  
皮膚者。有礙于臟腑支節者。游溢遍身。無所不至。痰氣既盛。必勝主  
或奪於脾之太絡也。氣則倏然止地。此痰厥也。升於肺者。則喘急咳嗽  
迷於心者。則怔忡恍惚。走於肝。則眩暈不仁。脇肋脹滿。關於腎。則咯而  
多痰。滯流於中脘。則嘔瀉而作。寒熱注於胃。則咽膈不利。有痰宜入  
於腸。漉漉有聲。散於胸背。則揪觸一點疼痛。或寒如手大。或背痺下  
散。則有聲聚則不利。丁身上下。變化百病。治當各從所以。是以虛宜補  
之火。宜降之氣。宜順之鬱。宜開之食。宜導之風。寒濕熱宜發散。清燥以  
除之。故曰。治病必求其本。

○一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰  
宜後方加減。

二陳湯

陳皮

去白一錢

半夏

湯泡二錢

白茯苓

去皮一錢

甘草

五分

右剉丁劑。生薑三片。水煎溫服。

一濕痰盛者。身軟而重。加蒼朮白朮。

一熱痰。加黃連黃芩。痰因火盛逆上。降火爲先。加白朮黃芩。軟石高黃連。

之類。眩暈嘈雜者。火動其痰也。亦加山梔黃連黃芩。

一風痰。加天麻枳殼南星白附子殭蠶牙皂之類。氣虛者。加竹瀝。氣實者。

加荆瀝。俱用薑汁。

一老痰。用海石半夏瓜蒌香附連翹之類。五倍子佐他藥。大治頑痰。宜先。

藥。喉中有物。咯不出。嚥不下。此痰結也。用藥化之。加鹹藥軟堅之類。宜。

瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附。少佐朴硝薑汁煉蜜和丸。喻服之。脉滑。

者。卒難得開。必費調理。氣實痰熱結者。吐難得出。或成塊。吐咯不出。氣。

滯者。難治。

一寒痰。痞塞胸中。倍加半夏。甚者。加麻黃細辛烏頭之類。痰厥頭痛。亦加。

半夏

一食積痰加神曲麥芽山楂炒黃連枳實以消之若必用攻之宜枳實兼血虛者用補血藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星

一血虛有痰加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍桑白皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑汁非汁飲三五盞必胸中煩燥不寧後愈

一氣虛有痰加入參白朮脾虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍神曲麥芽兼用升脉提起肉傷夾痰加入參黃芪白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤妙

一痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐如

防風川芎桔梗茶芽生薑薑汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊勒肚於不通風處行之

一痰在腸胃間可下而愈積實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生而多

一痰在脇下非白芥子不能達

一痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生薑韭汁隔間有痰或癲狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

一凡人身中上下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

一凡人頭面頸項身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

一凡痰之爲物無處不到爲隨氣升降故也

○一論竹瀝大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者得竹瀝

灌之遂甦誠起死回生藥也

用水竹早筴竹截長二尺許小者每段劈作二片大者劈作四片入井水浸一小時許以薄磚一塊排定將竹片架於磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盆盛瀝每六分中加薑汁一分服之痰熱甚者止可加半分耳用此竹瀝加入湯藥內服之尤妙取荆瀝亦治熱痰亦照此法取之

○一論痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲故曰痰因火動降火為先火因氣逆順氣為要

加減二陳湯

橘紅去白一錢 半夏製一錢半

白朮去蘆一錢二分 連翹五分

香附便炒一錢 甘草三分

白茯苓去皮一錢 貝母半一錢

黃芩酒炒一錢 防風去蘆五分

枳實一錢 天花粉七分

右剉生薑三片水煎溫服

○一論熱痰在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結  
開結化痰湯

陳皮

半夏製

茯苓

桔梗

枳殼

貝母

瓜蒌仁

黃連

黃芩

梔子

蘇子

桑皮

朴硝

杏仁

甘草

右剉水煎入薑汁磨木香服

○一論遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如冰冷脉來沉滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也

清濕化痰湯

南星泡

半夏製

陳皮

去白茯苓

去皮

蒼朮炒

羌活

酒芩

白芷

白芥子

甘草

右剉木煎入竹瀝薑汁磨木香溫服○骨體痛甚及有腫塊作痛者從



曰痰塊加乳香沒藥海石朴硝。○頭頂痛加川芎威靈仙。○手臂膊痛加薄荷桂枝南星等藥至痛處。

○一論肉傷七情痰迷心候神不守舍神出舍空則痰生以致智喪壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫証類傷寒兼治中風痰厥氣厥不省人事者。

清熱導痰湯

人參

白朮

去蘆茯苓

去皮陳皮

去白半夏

姜製南星

姜製

枳實

姜炒桔梗

黃連

黃芩

瓜蒌仁

甘草

右劉生薑煎入竹瀝薑汁同服。

家傳清氣化痰丸

製造甚得法化痰清火開膈順氣消痞除脹醒酒消食殊効。

食殊効。

大南星

四兩

大半夏

四兩

二味先用米泔水各浸三五日以透

為度洗淨切片以碗丁箇盛貯曬乾先薑汁次皂汁又次礬汁又取

硝水西乾

一用生薑汁浸一日夕曬乾

一用皂角煎水去渣浸一日夕曬乾

一用白礬二兩煮水浸一日夕曬乾

一用朴硝二兩煮水浸一日夕多洗曬乾

青皮去穢

陳皮去白

枳殼去穢

枳實麩炒

白朮去蘆

白茯苓去皮

蘇子炒

白芥子炒

蘿蔔子炒

香附薑水炒

瓜蒌仁

乾葛

桔梗去皮

杏仁去蘆

黃芩酒炒

神曲炒

麥芽炒

山楂蒸去子

白豆蔻去殼

前胡去蘆

甘草各一兩

右為細末用前浸四味藥水加竹瀝下碗泡蒸餅為丸如梧子大每服五七十九或茶或薑湯任下

一論健脾胃清火化痰頑痰能軟結痰能開陳風養血清上焦之火除

胸膈之痰清頭目止眩暈

千金化痰丸

膽星 四兩

半夏 姜礬牙皂同煮

陳皮 去三兩

白茯苓 去二兩

枳實 麩炒一兩

海石 火煨二兩

天花粉 二兩

片苓 酒炒二兩

黃柏 酒炒一兩

知母 酒炒一兩

當歸 酒洗四兩

天麻 火煨三兩

防風 去蘆二兩

白附子 炮二兩

甘草 生三兩

大黃 酒蒸五兩

白朮 米泔浸二兩

氣虛加入參 八錢

右為細末神麩二兩打糊為丸如梧子大每服七八十九茶水任下

一秤金 一名金珠化痰丸治痰嗽如神又治勞嗽

用半夏十斤米泔水浸十日換水三次取出切作兩半曬乾用白礬

五斤水一桶入鐵鍋內化開將半夏入礬水內浸二十日取出切作

四瓣曬乾用生薑十斤另研取汁再入半夏浸二十日取出曬乾為

細末聽用粉草十斤去皮為粗入鍋內添水煮數沸取出以布濾去

渣將淨水仍入鍋內熬成膏和成劑每病重者用藥二錢半輕者

二錢金箔十張和一大丸與病人嚼化忌房事此藥神效不可輕忽

○一治痰壅方

梨汁一鍾

生薑汁半鍾

蜜半鍾

南薄荷末三兩

右和勻重湯煮十餘沸任意食降痰驗如奔馬

○一論痰飲為病或癰或狂或眩暈等症無不奏效

白丸子 中州傅明岐傳

川南星 四兩 半夏 十兩

白附子 五兩 小川烏 三兩

右俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日晒夜露其星半另放磁器內少加薑汁同浸去麻性次將前藥磨又將絹巾濾去汁將粉晒乾白米糊為丸如梧子大每服五六十丸薑湯滾水任下其藥放舌上不麻為度方妙

釣痰仙方 曾府秘方

礞砂 一錢

白礞 半生半

磁青 上細礞砂打下

瓜蒂 五分

青蒙石

煅紅石  
內丁鈔

右共研細末每用二錢薄荷煎湯調入鼻內即愈

○一人氣短有痰小便赤澀足跟作痛尺脉浮大按之則澹此腎虛而痰飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有欲用腎氣丸補而逐之誠開後學之蒙瞶濟無窮之天枉腎氣丸即六味丸也

○丁儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連甚甚加桑皮杏仁益汗氣促加貝母枳殼不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以接中氣而愈

○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳苓連枳殼之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸牽縮四肢痿軟日哺益甚內熱口乾形體倦怠余以為鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其證疾年餘悉愈形體康健

補中益氣湯

見內傷

六味丸

八味丸

俱見補益

# 咳嗽

脉咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞瀉難左關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當咳嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉實熱洪滑多痰弦瀉少血形盛脉細不足以息沉少伏匿皆是死脉惟有浮大而嗽者生。

夫嗽謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷脾氣而動脾濕也病本須分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也戴云因風寒者鼻塞聲重惡寒者是也因火者有聲痰少而不者是也因勞者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急身重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也治法須分新久虛實新病風寒則散之太熱則清之痰涎則化之濕熱則瀉之各病便屬虛屬實氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之然

之降之則治虛之法也

○一論四時感冒發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰涎  
中快膈不致傷脾此藥大解肌熱潮熱將欲成癰痰嗽喘熱並効用  
參蘇飲

紫蘇

前胡

桔梗

枳殼 去穢

乾薑

陳皮

半夏 湯泡

白茯苓 去皮各一錢

甘草 三分

人參 五分

水香 三分 治病熱嗽

右剉下劑薑棗煎服○若未寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗  
鼻塞聲重加麻黃二錢杏仁一錢金沸草一錢以汗散之○若初感冒  
肺多有熱加杏仁桑皮黃芩烏梅○胸滿痰多加瓜蒌仁○氣促喘嗽  
加知母貝母肺寒咳嗽加五味乾薑○心下痞悶煩熱嘔穢惡心或停  
酒不散加薑炒黃連枳實乾薑陳皮倍用之○鼻衄加烏梅來向久白  
茅根○心盛發熱加柴胡黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽吐血加升

麻牡丹皮生地黃。○人熱咳嗽久不愈加知母貝母麥門冬。○見血加  
阿膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮。○吐血瘀嗽加四物湯名茯苓補心陽  
○姪娘傷寒去半夏加香附子。

○一論上氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴。

二母清順湯

天門冬去心一錢麥門冬去心一錢知母蜜湯浸二錢貝母甘草湯洗二錢人參五分

當歸身一錢枯苓一錢山梔子錢炒一錢玄參一錢桔梗一錢

天花粉一錢薄荷七分生甘草三分

右剉水煎服。

清熱寧嗽化痰定喘丸

橘紅五錢 青黛三錢 貝母七錢 膽星一兩 天花粉七錢

桑白皮七錢 杏仁去皮尖七錢 桔梗七錢 黃芩五錢 前胡七錢

甘草三錢



右爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服一丸淡薑湯化下。

○一論痰飲服前方不効者多屬氣血虛弱四肢沉困宜八物湯加黃柏知母貝母麥門五味瓜蒌紫蘇陳皮等分薑棗煎服。

○一論咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝以後方服之。

補中益氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子○六味地黃丸方見補益依本方加麥門冬五味子。

○一論傷風鼻塞流涕涕寒禁噴嚏此脾肺氣虛不能實腠理以補中益氣湯主之。

○一論咳嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪。

補中益氣湯加茯苓半夏五味而愈。

○一論咳嗽吐痰失音聲啞此元氣虛弱而致也。

補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩瓜蒌仁。

○一論咳嗽吐痰手足時冷此脾肺虛寒以補中益氣湯加炮乾薑三五片  
○一論聲音不出用新棉花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中神中時時  
將一二粒口中咀嚼嚙之使喉中常有味久聲自出

○一治語言不出用

真蘇子二兩訶子三箇杏仁三十百藥煎二兩  
右爲末每服二錢熱酒調服

○一治久嗽語聲不出

訶子去核杏仁炮去皮通草二錢

右剉每服四錢煨薑五片水煎食後溫服

○一論年老人日久咳嗽不能卧者多年不愈用

猪板油四兩蜂蜜四兩米糖四兩

右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中嚙化三五日其嗽即止

○一論久年咳嗽吐痰

銀杏膏

陳細茶四兩 白果肉四兩 一半去紅膜

核桃肉四兩 家蜜半斤

右藥入內煉成膏不拘時服

○一治久嗽不瘥并虛勞喘嗽

紫苑去蘆頭 款冬花各一兩 百部五錢

右為末每服三錢生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後臨卧各一服

○一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁丁勻加白蜜三茶

匙同放茶碗內煎一滾溫服三四次即止

○一切咳嗽上氣者一道士專賣此藥不拘新久皆効

乾薑 桂心紫色辛辣 皂莢泡去皮子肥

右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗篩一遍煉白蜜搜和又

搗一二千杵每服三丸加糖桐子大不限食之先後嗽發即服日進三

五服忌葱蒜油膩麪物

○一論年久近日咳嗽哮喘急等症

神吸散 國子博士顏心吾傳

鵝管石

火煨好醋淬  
七急一錢

餘糧石

火煨醋淬  
七次一錢

官桂 三分

粉草 三分

枯白礬 五分

款冬花 五分

石膏 煨五分

右為細末每服三分三釐準秤至夜食後靜坐片時將藥放帑上以竹

筒五寸長直插喉內用力吸藥速亦不問吸藥全盡為度以細茶下口

嗽而嚥之忌雞魚羊鵝一切動風發物并生冷諸物惟食白煮猪肉雞

子戒三十日宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲下筒炒成炭桑

白皮不拘多少用水同炊至熟爛去藥至五更病人不要開口言語食

入將湯肺喂之病人嚼吃任用餘者過時再食神效

○一論久嗽痰喘百藥不效并久年不瘥者或能飲酒入久嗽尤效

清金膏 曲阜令孔桂密傳

天門冬

八兩

麥門冬

杏仁

半夏

右五味切片。水熬去渣取汁。五碗入白粉葛末四兩。蜜一斤。共前汁入罈內。重湯煮六日。成膏。取出。每日無時頻服之。

○一人時唾痰涎。內熱作渴。肢體倦怠。勞而足熱。用清氣化痰益甚。余曰。此腎水泛而為痰。法當補腎。不信。另進滋痰丸。一服吐瀉不止。飲食不入。頭暈眼閉。始信。余用六君子湯數劑。胃氣漸復。却用六味丸。月餘諸症悉愈。

○一人咳嗽氣喘。舉舉流涕。余用參蘇飲一劑。以散寒邪。更用補中益氣。以實脾理而愈。後因勞怒。仍作自用。前飲益甚。加黃連枳實。腹脹不食。小便短少。二陳四苓。前症愈。劇小使不通。余曰。腹脹不食。脾胃虛也。小便短少。肺腎虛也。悉因攻伐所致。接以六君子加黃芪炮薑五味。二劑諸症頓退。再用補中益氣加炮薑五味數劑。全愈。

一治咳嗽秘方

欬多花三錢 石燕三錢 礪砂七厘 甘草三錢

右爲末吹入喉內用細茶漱下即好

# 喘而急

脉滑而手足溫者生脉沉滿而四肢寒者死數者亦死爲其形損故也  
肺受邪則喘手太陰肺專主外感無汗而喘屬表實有汗而喘屬表虛  
凡冬喘未發扶正氣爲要已發攻邪爲主太僕喘急甚者不可使用苦藥  
水氣盛故也

○一論外邪在表無汗而喘者

五虎湯

麻黃三錢 杏仁三錢 石膏五錢 甘草一錢 細茶一撮

有痰加二陳湯

右剉一劑生薑蔥水煎熱服加桑白皮一錢尤良

○一論在裏邪實不便脉實而喘者

三乙承氣湯

大黃 芒硝 厚朴 枳實 甘草 加木香

檳榔

右劉生薑三片水煎熱服

○一論痰盛而喘者此治痰喘不能卧入扶而坐數日一服而安用

干縉導痰湯

南星 一錢 半夏 七箇火炮破 赤茯苓 枳殼 麩炒各

皂角 一寸炙甘草 一寸炙

右劉生薑二指大水煎服

○一論七情鬱結上氣而喘者用

四磨湯

人參 檳榔 沉香 烏藥

右四味各用米磨汁合下處溫服之

三子湯 治氣喘如神

蘇子

白芥子

蘿蔔子

水煎服立已

○一論腹脹氣喘坐卧不得者宜服

沉香散

沉香二錢半 木香二錢半 枳殼熟炒三錢

蘿蔔子 三錢

右剉一劑生薑三片水煎溫服

○一論喘急因內傷元氣氣不接續而喘者宜用

補中益氣湯方見內傷

○一論陰虛火動火炎上攻而喘者宜此

清離滋坎湯方見勞瘵一用六味九加黃柏知母亦効

○一論虛陽上攻氣不升降上感下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽而喘

蘇子降氣湯



蘇子 五錢

陳皮

厚朴 姜汁炒 前胡

肉桂 各二錢

半夏 五錢

當歸 三錢

甘草 一錢

右剉薑棗煎服。

○一論老人痰嗽氣喘宜服

三子養親湯

白芥子 研八分

蘿蔔子 研八分

蘇子 研八分

南星 水炮 八分

半夏 水炮 八分

陳皮 去白 六分

枳實 炒 六分

片苓 去折 八分

赤茯苓 去皮 八分

甘草 二分

右剉一剉生薑三片水煎溫服。

○一人體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連益甚加桑皮杏仁益汗氣促加

貝母枳殼不時發熱予以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣

湯接補中氣 八味丸見補益

哮喘

大抵脉浮而滑易治微細而滑難治

大孝孔以聲響名喉中如水雞聲者是也專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者治之有以紫金丹導痰小胃丹劫之而愈者有以六味地黃丸補中益氣湯兼而進之而愈者必須量虛實而治之也

千金定喘湯 治哮喘如神

麻黃三錢 桑白皮三錢 杏仁一錢 蘇子二錢 白果一箇

款冬花三錢 黃芩一錢 半夏五錢 甘草一錢

右剉白水煎食遠服

諸病原來有藥方 惟愁喘最難治 麻黃桑杏蘇子

白果冬花更又良 甘草黃芩同半夏 水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥 服後方知定喘湯

一論人素有喘急遇寒暄不常發則不已哮喘夜不得睡者用此

蘇沉九寶湯

紫蘇

陳皮

薄荷

麻黃

杏仁

去皮

桑白皮

大伏皮

官桂

甘草

右剉用生薑三片烏梅一箇水二碗煎至八分食後服即効且佳服惟慎勞碌戒厚味節慾日間常服此順氣化痰九夜臥時服抑火潤下九如除根須修合六味地黃九加黃精知母人參紫苑五味子百合各二兩浮小麥粉熟蜜四兩打糊為丸每服百九空心柿餅湯送下餅隨食之

二母九

治哮喘

知母

去皮

貝母

去心

百藥煎

一兩

右為細末將烏梅肉蒸熟搗爛為丸如梧子大每服三十丸臨臥或食後連皮薑湯送下

○論喘氣哮喘上喘不休或是鹽戩水戟肺癆俗謂之喘氣病用此

秘方

小蓴草一把用猪粉肉四兩入水同炊令熟食肉并湯服其草于  
月生七八月有四棱莖葉尖秒有花子

○一論九遇天氣欲作雨者便發熱喘甚至平卧不得飲食不進此乃肺  
竅中積有痰乘天陰寒氣從背且鼻而入則肺脹作聲此病有至  
終身者亦有子母相傳者每發即服不過七八次覺痰腥臭吐白  
是絕其根也用此方

### 紫金丹

白砒一錢生用

枯白礬三錢研

淡豆豉

出江表者一兩水浸去灰

右搗作丸如菽豆大但覺拳發用冷茶送下七丸其有九丸以不發為  
愈再不必多增丸數慎之小兒服一二丸

導痰小胃丹

方見痰飲治哮喘經年不愈宜久服之斷根

○一論哮喘氣急而不得息者宜用

均氣八仙湯

麻黃二錢

杏仁三錢

石膏三錢

桔梗一錢

片苓二錢

知母二錢

貝母

一錢用北沙參三錢煎湯拌炒

生甘草一錢

右剉一劑水煎溫服

○一治上氣喘急經年咳嗽肺癆久不愈遇發即服服三五次永不復發

奪命丹

人詳一錢

白礬二錢

白附子三錢

南星

四錢半夏 泡五錢

右先用人言與白礬一處於石器內火烘紅出火黃色為度切不可犯

鐵器却和半夏南星白附為末生薑汁煮凝糊為丸黍米大朱砂為衣

每服七丸小兒三丸非化水下忌食熱物

孝乳靈秘丹

方上異人傳

膽南星

二兩

大半夏

二兩用白礬五錢牙皂五錢同炒一夜不見白星

赤茯苓

二兩

苦葶藶

二兩

大貝母

二兩

沉香

一兩

青礬石

五兩

天竺黃

二錢

珍珠

三錢豆

羚羊角

一支

烏犀角

二錢

白礬

一兩

硃砂

一兩

風化硝五錢 花蘆石五錢 孩兒茶五錢 欬冬花一兩 鈴白霜五錢  
右為細末煉蜜為丸如梧子六每服三二十九臨卧淡薑湯下外製六  
味地黃丸空心服百發百中真仙方也

○一治素患哮喘之疾發則喘急痰嗽上壅不時舉發令慎勞役戒房事  
節慾早服六味丸加黃柏知母人參熟地五味百合各二兩淨小麥粉  
蜜四兩打糊為丸每服百九空心柿餅湯下飽隨食之夜臥時服湯  
各一料而愈

千金定吼丸

南星

貝母

白附子

錦紋大黃

右為細末竹瀝薑汁和為丸

半夏

枳實

天麻

九

和為丸

各四兩用生薑牙皂各二兩煎湯浸星半日切片再

如日發二兩入湯內同煎星半日切片再

黃連薑炒黃芩酒炒連翹去心

瓜蒌仁各二兩

沉香五錢

如黍米大煮湯下亦可

○一人嗜乳十數年發則上氣喘促咳嗽吐血自汗四肢厥冷六脈沉細此氣虛脾弱。

黃芪蜜水炒人參

白朮去蘆白茯苓去皮半夏姜炒

杏仁去皮五味子 麥門冬去心天門冬去心陳皮

甘草 右剉薑棗煎服

○一人自幼患嗜乳之症每遇寒即發發則上氣喘急咳嗽痰涎上壅年久不瘥已成痼疾百藥罔効予製此方一料全愈

清上補下丸

懷生地黃砂鍋內酒拌石聚酒蒸去核 懷山藥二兩

白茯苓去皮一兩五錢牡丹皮一兩五錢 澤瀉一兩五錢

遼五味子一兩五錢 天門冬去心一兩五錢 麥門冬去心一兩

枳實姜炒一兩五錢 月母一兩五錢 桔梗去蘆一兩五錢

黃連

薑炒一兩五錢

杏仁

去皮一兩五錢

半夏

薑炒一兩五錢

瓜蒌仁

去油一兩五錢 枯芩酒炒一兩五錢

甘草五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空心淡薑湯下。

# 瘧疾

脈弦數滑實皆順沉細虛微為逆。瘧脉自弦微則為虛代散則死。

瘧疾皆因先傷於暑次感於風客於榮衛之間腠理不密復遇風寒因而  
不出合於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行於陰並則病作離則  
病止併於陽則熱併於陰則寒淺則日作深則間日作氣則易在血則  
晏秋本經曰瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦短者傷食弦滑者  
多痰弦而緊者宜下浮大者宜吐弦遲者宜溫此治瘧之大法其治瘧  
多寒少心煩少睡者屬心名曰溫瘧用柴苓湯但寒少熱腹疼足冷者  
屬腎名曰寒瘧用桂附二陳湯先寒而後大熱咳嗽者屬肺名曰癰瘧



用參蘇飲熱裏寒短筋脉攣縮者屬脾名曰風瘧用小柴胡湯加烏藥  
香附寒熱相停嘔吐痰沫者屬脾名曰食瘧用清脾飲建愈之後發熱  
兩虛勞瘧咳嗽不盡保養遂成勞瘵若能清心養體節食適其如此調  
治無不愈矣

○一論瘧疾無汗要有汗散邪為主大凡瘧疾初起宜服此發散出汗立  
愈用此方  
散邪湯

川芎 白芷 麻黃 白芍 防風 荆芥 紫蘇  
羌活 甘草

右剉生薑三片葱白二根水煎露一宿次早溫服有痰加陳皮有  
濕加蒼朮○夾食加香附

○一論瘧疾有汗要無汗正氣為主宜用  
正氣湯

柴胡

前胡

川芎

白芷

半夏

麥門冬

檳榔

草果

青皮

茯苓

桂枝

甘草

右劉蘆葉煎預先熱服。

○一論瘧疾不論先寒後熱先熱後寒諸瘧通用。

清脾飲

青皮

去穢厚朴

薑炒白朮

去蘆半夏

薑炒柴胡

黃芩

茯苓

草果

甘草

右劉生薑五片水煎溫服。

○一論諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澀或作吐瀉用。

加減柴苓湯

柴胡

黃芩

半夏

薑炒猪苓

澤瀉

蒼朮

米泔浸

青皮

厚朴

薑炒檳榔

草果

烏梅

甘草

右劉蘆葉煎服。

壽世保元

內集三卷

○一論五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚凝飲阻衛氣相搏發為癰疾并治諸癰

四獸飲

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

橘紅

半夏

姜製

草果仁

烏梅

去核

甘草

生薑

棗子

各等分

右剉以鹽少許淹食頃用厚皮布包裹以水濕之慢火炮令香熟煎乾每服二兩水一碗煎半碗溫服未發前連進數服神効

○一論人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致癰疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣或癰發經年不愈則氣血皆虛癰邪深入名曰癰疽此方主之

加味補中益氣湯

黃芪

蜜炒

人參

八分

白朮

去蘆

陳皮

六分

當歸

八分

柴胡

一錢

升麻

分

白芍

八分

黃芩

一錢

半夏

八分

甘草 五分

右剉薑棗煎空心服。○有汗加桂枝五分倍黃芪。○熱盛倍柴芩。○渴加麥門冬天花粉。

○一治傷暑發癰宜服。

香茹散

香茹 四錢 厚朴 薑炒 扁豆 各一錢 烏梅 一箇

右水煎臨熟入薑汁一匙溫服。

○一論熱瘧火盛舌卷焦黑鼻如烟色六脉洪弦而緊此乃陽毒而深先以青布相疊數重新汲水漬之搭手胸上須臾再易如此三次熱勢稍退即服此藥。

龍虎湯

柴胡 一錢 五分

黃芩 一錢

半夏 七分

石膏 二錢 五分

知母 一錢

黃連 一錢 五分

黃柏 一錢

梔子 八分

粳米 五十粒

右劉薑棗煎服

○一治瘰癧太熱煩燥宜用

地龍飲子

生地龍三條研入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調和服如熱加龍腦少許

○一治虛弱之人患瘰癧初起感寒者宜

五積散依本方用薑葱煎服方見中寒

○一論體虛之人患瘰癧寒多久不愈者不可用截藥宜用

分利順元散

川烏一兩去皮附子一兩去皮

半生半熟

南星

二兩半生

木香

五錢不見火

右劉每服四錢生薑十片棗七枚水一盞煎七分當發早晨速進二三服半生半熟能分解陰陽也

○一論諸瘰癧不問先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日并發或間

日一發。頭疼惡心煩渴引飲。氣息喘急。口苦咽乾。諸藥不効者。服此截之。

### 常山飲子

常山二錢

草果二錢不去皮 知母二錢

良薑一錢五分

烏梅一錢五分

甘草炙一錢

右剉一兩。一劑棗五枚。未發時前連進二服。

○一論瘧疾夜發者。乃陰經有邪。此散血中之風寒也。宜此。

### 麻黃桂枝湯

麻黃一兩去節

桂枝二錢

黃芩五錢

枳仁

去皮

甘草炙三錢

右剉水煎服。桃仁散血緩肝之藥。

○久瘧腹中有癰。用冰磨沉香。下雄黃解毒丸。打下黑血如泥。極見其驗也。方見通治。

○一海外高僧傳于周少峰。治瘧疾。不問新久。虛實寒熱。諸般鬼邪邪症。

瘟疫瘧瘧。一服立愈。其効如神。

番木鱉

即馬銀子去歲

雄黃一錢

朱砂一錢

甘草一錢

右共爲細末。每服四分。其瘧將發。預先吃飯一碗。將藥水酒調服。被蓋臥睡。即愈。

○一治瘧疾。先寒後熱。熱多寒少。或單熱不寒者。

桂枝五錢

石膏五錢

知母五錢

黃芩一兩

右剉水煎服。

○一治瘧疾。服藥寒熱轉大者。知太陽陽明少陽三陽合病也。

小柴胡湯加石膏。知母。桂枝。水煎服。

○一治久瘧。不能食。胸中鬱鬱欲吐而不吐。以此吐之。

雄黃

甜瓜蒂

赤小豆

各等分

右爲末。每服五分。溫水調下。以吐爲度。

○一論久瘧。結成癥瘕。癖在胸脇之間。諸藥不愈者。宜

痰癰飲

蒼朮酥酒

草果去皮

桔梗

青皮

陳皮

良薑各五錢

白芷

白茯苓

半夏湯泡  
姜炒

枳殼熨炒

桂心

乾薑酒洗  
各三錢

蘇葉

川芎各二錢

甘草炙三錢

右每服一兩水煎入鹽少許空心服

○一治久瘧腹中痞塊用

阿魏丸

鱉甲醋炙  
二兩

三棱醋浸  
炒

莪朮醋浸  
炒

香附子米泔浸  
各二兩五錢

陳皮一兩

真阿魏五錢

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸淡薑湯送下

○一論癰疾一月一發或一月一發或三五日一發或經三四月或半年

一載或誤用止截太過久不能愈者此元氣脾胃大虛以

補中益氣湯方見內傷依本方加常山檳榔知母貝母一二劑立已愈後



去四味只用本方調理多服自然正氣盛則邪氣自退矣

○一論患瘧寒熱用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神思昏倦脉或浮洪或微細此陽氣虛寒以

補中益氣湯方見內傷依本方參芪歸朮各用三錢甘草一錢五分加炒乾薑炮附子各一錢一劑寒熱止數劑元氣復

○一論經年久瘧氣血俱虛而三日五日一發者以十全大補湯方見補益依本方益邪氣在陽分淺而易治邪氣在陰分深

而難治宜多服為良

○一治三年久瘧不瘥用棟參乾生薑各五錢酒調服汗出立止

○一凡瘥後形體骨立發熱惡寒食少體虛補中益氣內參芪歸朮各加三錢甘草一錢五分炮薑二錢一劑而寒熱止數劑而元氣復

○一婦人瘥久不已發後口乾倦甚用七味白朮散加麥門五味作大劑煎與恣飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈凡瘥瘧

余常以參朮各一兩生薑四兩煨熟煎服即止或以太藥和中益氣加煨薑尤効生薑下味亦効

○一凡久瘧多屬元氣虛寒益氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱除火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾虛虛弱宜益氣湯諸症悉愈若手足厥冷加大附子

○一婦人久患瘧瘵作則經不行形虛脉大頭痛懶食太便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹益由久瘧正氣已虛陰火獨旺以益氣湯治之尋愈惟不時頭痛加蔓荊子而止又兼六味丸而經行

# 痢疾

脉宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急身寒則生身熱則死

痢者古之滯下是也多由感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃積鬱結而成也其症太便窘迫裏急後重數至圊而不能便腹中疼痛

所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚腦膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有淺深也其濕熱積滯于血分則赤于氣分則白赤白兼下氣血俱受邪也雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治之但分新久更量元氣用藥止痢初患元氣未虛必須下之下後大愈隨症調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下太便了而不了者血虛也數至固而不便者氣虛也○丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

下痢不治症

下如瀉膿生半死

下若屋漏水者必亡

下若塵腐色者必死

下純黑者死

下如竹筒直出者死

下純紅者難治

身熱脈大者死是亦太樞言之耳小使絕不通為胃絕

續因將軍丸

治痢之總司也

錦紋好太黃一斤切薄片分作四處聽用。

一分用川黃連去毛二兩切片水浸汁拌太黃同炒乾為度。

一分用吳茱萸去梗二兩用水泡出汁拌太黃同炒乾為度。

一分用小乳汁浸拌太黃同炒乾為度。

一分用童便浸太黃炒乾為度。

右四分共合一處為細末酒打米糊為丸如梧子大將一斗子蜜酒

將一斗子晒乾各包聽用。

如白痢用吳茱萸煎湯送下三十九半生半熟。

如赤痢用黃連煎湯送下三十九半生半熟。

如赤白痢用吳茱萸黃連煎湯送下三十九半生半熟。

○一論赤白痢疾初起積滯不行裏急後重頻登廁而去少腹痛等症

先用此下之。

香連化滯湯

當歸尾

一錢

白芍

一錢

生用

黃連

一錢

黃芩

一錢

黃柏

一錢

去皮

枳殼

去穢

炒一

錢五分

木香

一錢

大黃

三錢

生用

滑石

二錢

甘草

二分

木香

一錢

右劉水煎空心熱服

○一論下痢白多不拘新久或用前藥下後未愈者用此和之

白木和中湯

當歸

酒洗

白芍

炒上

白木

去穢

炒上

白茯苓

去皮

陳皮

中

黃芩

炒中

黃連

炒有紅

甘草

下

木香

少許

右劉水煎食前服

○一論下痢紅多不拘新久或用前藥下後未愈者用此調之

當歸調血湯

當歸

一錢

川芎

一錢

白芍

三錢

黃連

一錢

黃芩

一錢

桃仁

去皮

升麻

五分

右劉下痢水煎服。如白痢加吳茱萸炒下錢分通用酒炒。赤痢加白朮茯苓陳皮香附各下錢。

○一治赤痢血痢痛不可忍又治血痔其效如神病雖垂殆下服即愈  
逐瘀湯

阿膠炒

枳殼炒 茯苓

茯神

白芷

川芎

赤芍

生地黄

莪朮

木通

五靈脂炒

生甘草

桃仁去皮

大黃

各一錢五分

右到一劑水

下鍾半入蜜三匙再煎服。

○一治素有積熱下痢白膿腹痛膨脹晝夜無度漸至大便秘結小便不通此三焦有實熱也服此即愈或下痢純紅或赤白相雜皆效。

清臘解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

大黃

倍用

連翹

滑石

木通

車前子

海金沙

枳實

莪朮

右劉本煎空心服。

○一治，脾泄瀉痢疾屬氣虛宜此，  
加味六君子湯。

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 黃芪 各一錢 懷山藥 二錢

砂仁 研一錢 甘草 五分

右劉一劑棗三枚水煎空心溫服。○如腹痛加炒黑乾薑木香各五分  
烏梅一箇。

○一論下痢赤白膿血相雜腹痛裏急後重晝夜無度日久不愈不能起  
床不思飲食疲倦之甚或服寒涼峻利之過者宜

加減補中益氣湯方見內傷依本方去柴胡加白芍炒澤瀉木香砂仁白  
豆蔻地榆御米殼 脂炒三分

○一論胃經服排滌藥過及又服攻擊殺伐等他醫而不效者以攻形氣  
極弱去無休息精色耗候出者並與抄之。

養臟復元湯

人參三錢

白朮

去蘆炒五分

白茯苓

去皮一錢

白豆蔻

去殼研一錢

乾薑炒黑一錢

粟殼

去子蜜水炒二錢

製附子五分

烏梅三箇

木香一錢

甘草

炒五分

右剉一劑北棗三枚水煎空心溫服相再煎服謹節飲食

一論噤口痢其症有冷有熱有冷熱不調皆須先發散表裏如手心熱

目赤是熱宜敗毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢者是寒宜用

蓮肉不去心為末用米飲調服三錢敗毒散方見感冒又治痢疾

熱合境皆然者神效加白芍黃連尤効

一治虛弱人噤口痢飲食不下

參苓白朮散方見內傷依本方加石蓮肉石菖蒲各一兩或有氣滯

木香五錢

右共為末每服二錢棗湯調下禁口痢梗米湯下休息痢砂糖湯下



○一治下痢噤口諸藥不效者以

醇酒半盞薑汁半盞合米湯半盞三味合下處入陳乾松葉一握搗爛一并食之胃口立開如口不開用鐵筋撥開牙齒灌下立已

○一治噤口藥食俱不受用

田螺數枚連殼搗爛入麝少許調勻填滿臍內引熱下降服藥再不吐矣

○一治噤口痢食不下

老蒼米炒香熟爲末泔搗火煨每米粉三四匙鹽少許白滾水下

○一治下痢噤口點眼方黃芩江傳

用首胎黃炙乾每錢加雄黃五分胡黃連四分片腦少許共爲細末羅牆點兩眼角

○一治下痢噤口傳明岐傳

用首胎黃磁器收入水銀養佳入麝少許點兩眼角即能食

○一治下痢噤口，胡養恒傳

用雞丁隻去毛，煮切片入罐內，用胡椒末五錢，入水同炊，用炭布重  
重密封，待熟用簪子刺孔，令患人鼻聞孔之氣，立時思食。

○一治下痢噤口，飲食不下，多是胃口熱甚。

川黃連三錢，人參一錢五分，甘草五分，一方加石蓮肉各一錢。

右用水煎，終日呷之，如吐，再強飲，但得一呷，立咽便好。

又方以秤槌燒紅，用好醋淋，令病人開口，吸氣吞之，即效。

○一治痢疾發，既益元散，用人參白朮煎湯調下，頻服，自止。

○一治冬痢休息，不止，百方不効，用黃連末木香末十分之一，攪臘頭去  
油，入藥水，煮爛，搗為丸，如梧子大，每服五十九，空心米湯下。

○一人年老，冬痢不止，肌瘦如柴，晝夜苦楚，命已垂危，用人參二兩，水煎  
服之，鼻有微汗而甦，後用十全大補湯調理而安。

○一人下痢，小腹急痛，太便欲去不去，此脾胃氣虛而下陷也，用補中益

氣送八味丸二劑而愈此等症候因利藥致損元氣肢體腫脹而死者不可枚舉

○一人停食患痢腹痛下墜或用疎導之劑兩足腫脹食少體倦煩熱作渴脉洪數按之微細予以六君子加薤白各二錢吳茱萸五味各一錢煎熟冷服之即睡覺而諸症退再劑全安此假熱而治以假寒也

○一人嘔吐不食腹痛後重自用大黃等藥二劑腹痛益甚自汗發熱煩憤脉大子用參朮各二兩炙甘草炮乾薑各三錢升麻一錢水煎一服而甦又用補中益氣湯加炮乾薑二劑而愈

○一人痢後兩足浮腫胸腹脹滿小便短少用分利之劑遍身腫脹氣喘予曰兩足浮腫脾氣下陷也胸腹脹滿脾虛作痞也小便短少脾不能生腎也身腫氣喘脾不能生肺也用補中益氣湯加大附子兩錢煎服後因飲食勞倦兩目浮腫小便短少仍服前藥頓愈

○一人下血服犀角地黄湯等藥其血愈多形體消瘦發熱少食近來後

重此脾氣下陷，余用補中益氣加炮薑、丁劑而愈。

○一人血痢及下血不止，以六味丸加地榆、阿膠炒黃連、黃芩、生地黃。

○一人患痢後重，自知醫用芍藥湯後重益甚，飲食少思，腹寒肢冷，予以為脾胃虧損，用六君子湯加木香、炮薑，二劑愈。

# 泄瀉

脈多沉傷於風，則浮傷於寒，則沉細。傷於暑則沉微，傷於濕則沉緩。洩而腹脹，脈弦者死。反云脈緩時微，小者生，浮大數者死。

夫泄瀉屬濕，屬氣虛有火，有痰，有食積，有寒，有脾泄，有腎泄。凡瀉水腹不痛者，濕也。飲食入胃不化，完穀不化者，氣虛也。腹瀉瀉水如魚湯，痛一陣瀉一陣者，火也。或瀉或不瀉，或多或少者，痰也。腹痛甚而泄瀉，痛減者，食積也。肚腹痛，四肢冷者，寒也。常常泄瀉者，脾泄也。五更泄者，腎泄也。宜分別而治也。太槩泄瀉因濕傷其脾者居多，以胃苓湯加減。

主之。

○一論中暑傷濕停飲夾食脾胃不和腹痛泄瀉作渴小便不利水穀不化陰陽不分者濕也。

胃苓湯 主方

蒼朮 米泔浸厚朴薑汁炒陳皮

猪苓

澤瀉各一錢

白朮去蘊炒白茯苓

五錢白芍炒肉桂

甘草炙各

右剉丁劑生薑三片棗二枚水煎溫服○泄瀉稍久加升麻防風○有

熱者加酒炒黃連○有寒者加炒乾薑○暴泄水瀉加滑石○食積加

山查神麴○有痰加半夏烏梅○氣虛加人參白朮○氣滯加木香○

久瀉加乾薑肉蔻○暴瀉赤白相雜腹痛裏急後重去桂加檳榔木香

黃連水煎服

○一論泄瀉飲食入胃不化完穀不化者氣虛也。

益氣健脾湯

人參

白朮

去蘆土炒

白茯苓

去皮

陳皮

白芍

炒

蒼朮

米泔浸

乾薑

炒黑

柯子

煨

肉寇

麩煨

升麻

酒洗

甘草

右劉薑棗煎服。○腹痛加桂。忌油膩。

○一論泄瀉腹痛。瀉水如熱。瀉痛一陣。瀉一陣者。火也。宜

加味四苓散。

白朮

去蘆

白茯苓

去猪苓

澤瀉

木通

梔子

黃芩

白芍

甘草

右劉燈心十莖。水煎。空心服。

○一論泄瀉或多或少。或瀉或不瀉者。痰也。宜

加味二陳湯。

陳皮

半夏

薑炒

白茯苓

去皮

白朮

去蘆土炒

蒼朮

米泔浸

厚朴

姜汁炒

砂仁

炒

山藥

車前子

木通

甘草

炙各等分

右劉下痢生薑三片烏梅一箇燈心十莖水煎溫服。

○一論泄瀉腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也用。

香砂平胃散

蒼朮

米泔浸

陳皮

厚朴

姜炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

半夏

姜炒

砂仁

香附

神麴

炒

白芍

炒

甘草

炙

右劉生薑煎服。

○一論劉草窓痛瀉要方。傷食腹痛得瀉便減今瀉而痛不止故責之土敗木賊也。

白朮

炒

三錢

白芍

炒

一錢

陳皮

炒

五分

防風

一錢

右劉水煎溫服。

○一論泄瀉肚腹疼痛四肢厥冷者寒也宜。

附子理中湯

白朮

去蘆

乾薑

炒

人參

白茯苓

去皮

砂仁

炒

厚朴

姜炒

姜汁

炒

蒼朮米泔炒熟附子甘草炙

右剉生薑水煎服

○一論泄瀉氣弱易飽常常稀瀉者此脾泄也用

扶脾散

蓮肉去心不去皮一兩半陳皮一兩白茯苓一兩白朮陳壁土炒三兩麥芽炒五錢

右為細末每服二錢白砂糖二錢滾白水送下補脾助元氣令人能食

止瀉

○一論滑瀉日夜無度腸胃虛寒不禁宜服

八柱散

人參白朮土炒肉蔻煨乾薑炒柯子煨

大附子麩裹炙去皮梁殼蜜水炒甘草等分

右剉一劑薑一片烏梅一箇燈心一團水煎服

補脾丸 症治同前



白朮

去蘆十兩分四分一肉桂二小荷三枚

蓮肉

去心炒人參各一兩甘草炙

白芍

炒各

木香

磨日錄

山藥

陳皮

各七錢乾薑炒三錢

右為細末，煮粥加炒神麴末，打糊為丸。如梧桐子大，每服百丸，空心淡薑湯下，專治老人弱人脾泄，飧泄，殊中。

○一論泄瀉，脾腎虛弱，便晨五更，作瀉或全不思食，或食而不化，大便不實者，此腎泄也。凡飯後隨即太便者，蓋脾胃受濟，所以有水穀之分，脾氣雖強，而腎氣不足，故飲食下咽而木腑為之，餐泄也。治法用二神丸。

二神丸

破故布四兩炒肉豆蔻二兩生用

右為末，用大紅棗四十九箇，生薑四兩，切碎，同棗用水煮熟，去薑，取棗肉和為丸，如梧子大，每服五十九丸，空心薑湯下，如吳茱萸泡炒一百五

味子二兩名四神丸治經年久瀉不止者神効

○一人善飲便滑溺澀食減胸滿腹足漸腫症屬脾胃虛寒以全腎腎丸食進腫消更用八味丸胃強脾健而愈

○一人病瀉每至五更輟即利此腎泄也用五味子散數服而愈因起居不慎泄復作年餘不瘥此命門火虛不能生脾土法當補其母火者土之母也遂用八味丸補其母瀉即止食漸進東垣云脾胃之氣虛則能食而肥虛則不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也故用八味丸委効只用六味丸亦可

○一論太便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾腎氣血俱虛十全大補湯方見補益選卡四神丸

○一論腎虛久瀉不正用六味地黃丸加五味子破故脂肉豆蔻裝藥立方見補益

○一論久瀉多由泛用消食利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久瀉

若非補中益氣湯四神丸滋其本源後必脫痞腹脹小便淋瀝多致不起。

○一人患泄瀉日久不止以致元氣下陷飲食入胃不化完穀不化肌肉消削肢體沉困面自兩足腫滿上氣喘急此元氣脾胃虛之甚也宜補中益氣湯方見內傷依本方減當歸加酒芍茯苓澤瀉山藥蓮肉木香乾薑炒黑止泄瀉之良方也。

○一泄瀉因內傷勞倦飲食化運作瀉及脾胃素蘊濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沉困泄瀉者以益氣湯去當歸加炒芍茯苓木香苓澤瀉薑棗煎服。

按右諸方治泄瀉有濕瀉有氣虛瀉有火瀉有痰瀉有食積瀉有脾敗本賊瀉有寒瀉有脾瀉有脾腎瀉有元氣下脫瀉有腎瀉有虛寒滑脫久瀉不止者宜依病對方而用也。

○一人食下即瀉而即瀉不敢食一匙食之即瀉諸藥不効以生紅柿

枚。以水濕灰火煑熟食之。不三四箇即止。

○秘方治泄瀉

用雞子一箇將小頭破開。入胡椒七粒。罨糊頂煨熟。好酒送下。燒酒更妙。將胡椒完吞下。

○一泄瀉二三日。或腹疼痛。生薑豆豉胡椒煎湯熱服立止。

○一治暴泄不止。小便不通。車前子沙為末。每服二錢米飲調下。其根葉亦可搗升服。此藥利水道而不動元氣。

○一治泄瀉。用豬脬肚一枚。淨洗去脂膜。入大蒜在內。以米蕒爛搗碎。入蒼朮滑製陳皮厚朴薑砂甘草炙等分。為末同杵為丸。如梧桐子大。每服三五十九。空心米湯下。薑湯亦可。

○一治許州黃太守患泄瀉。二三年不愈。每飲燒酒三鍾則止。二三日以為常。畏藥不治。召余診之。六脉弦數。先服此藥。以解酒毒。後服理氣健脾丸。加澤瀉而愈。方見傷食門。

宜黃連一兩生薑四兩

右爲二處以慢火炒令薑草脫色去薑取連搗末每服二錢空心開茶清下甚者不過二服專治久患脾洩

○一太便澹泄米穀不化用

黃連酒炒白芍煨吳茱萸炒各等分

右爲細末用小米飯爲丸如梧子大每服五六十丸空心米湯送下

○一治泄瀉手足冷不渴腹痛用入參白朮乾薑甘草水煎熱服中寒者加附子

○一治久瀉太腸滑泄五倍子炒五兩爲末麩糊爲丸如梧子大每服五九米飲下日三服

六味丸 金匱腎氣丸 八味丸 十全大補湯俱見補益

補中益氣湯見內傷

補遺

三白散 治一切泄瀉如神

白朮

去鹽炒一錢

白芍

炒五分

白茯苓

去皮澤瀉一錢

厚朴

姜炒

黃連

炒各一錢

乾薑

炒五分

烏梅肉

煎用三錢

九用三錢

如兼傷食

加神麴

炒麥芽

炒各一錢

右劉生薑三片水煎食前服為末神麴為丸服尤効

# 霍亂

明大者生。○脉微弱而遲者死。○脉代者霍亂氣少不語舌捲囊縮者不治。

夫霍亂者。揮霍變亂也。其證心腹卒痛。嘔吐下利。發熱增寒。頭暈眩。瀉而不吐。或吐而不瀉。先心痛。則先吐。先腹痛。則先瀉。心腹俱痛。則吐瀉俱作。甚則轉筋。煩頓。手足厥冷。死生反掌間耳。治宜霍亂者。正氣虛。加生薑為上。不惟可以驅散風邪。神亦可調理吐瀉。蓋有輕瀉名。瀉霍亂。

死者少也。若上不得吐，下不得瀉，名乾霍亂而死者多也。治之急須以  
鹽湯灌之，令其大吐。庶有可生者。切莫與穀食，雖米飲下咽，入口即死。  
必待吐瀉過二三時，直至飢甚，方可與稀粥。慢慢調勻，可也。轉筋不任  
男子，以手挽其陰。女子，以手牽乳，近兩邊，此千金妙法也。

○一論四時不正之氣，寒疫時氣，山嵐瘴氣，雨濕蒸氣，或中寒腹痛吐瀉，  
中暑冒風吐瀉，中濕身重泄瀉，或不服水土，脾胃不和，飲食停滯，復感  
外寒，頭痛憎寒，或嘔逆惡心，胸膈痞悶，或發熱無汗者，並治。

霍香正氣散

霍香 二錢

紫蘇

陳皮

厚朴

薑汁炒

半夏 薑汁炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

桔梗

去蘆

大腹皮

白芷 各一錢

甘草 五分

右剉二劑，生薑棗子煎服。○霍亂轉筋，加木瓜。○腹痛，加芍藥。○寒  
痛，加官桂。○吐瀉，加乾薑。○飲食不化，心下痞悶，加香附砂仁。○米穀不

化加神曲炒麥芽炒。○肉食不化加山楂。○心下痞加枳實青皮。○中  
暑冒風加香茹扁豆。○時氣增寒壯熱加柴胡乾葛。○發熱加麥門冬  
淡竹葉。○口渴作渴小便不利合五苓散。○濕熱相搏霍亂轉筋煩渴  
悶亂合黃連香茹散。○心腹絞痛加木香。○若頻欲登圜不通利者加  
枳殼。

○一論霍亂之疾未有不由內傷生冷外感風寒而致也。余用藿香正氣  
散治之百發百中。一歲之內常治百人未有弗効者。但有熱者須加薑  
炒黃連寒甚者加乾薑萬無一失。又腹痛加桂。痛甚去藿香加吳茱萸  
小便不利加茯苓。如乾霍亂加枳殼白茯苓官桂最嘉。  
○一治虛弱之人上吐下瀉霍亂手足厥冷腹痛脉微者乃陰症也。  
理中湯

人參

白朮 去蘆炒 乾薑炮

甘草 炙各等分

若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯下



若霍亂吐瀉加青皮陳皮名治中湯

若霍亂心腹作痛先以鹽湯頻服候吐出即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏生薑十片

若泄瀉加橘皮茯苓名補中湯

若瀉瀉不已於補中湯內加附子一兩

若不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓

若霍亂吐下心腹作痛手足厥冷去白朮加附子名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗湯再不愈及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急

痛手不可近者加枳實茯苓名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯加天花粉○渴欲飲水加白朮

若霍亂轉筋理中湯加冰瀝石羔

若膝上築者腎氣動也去白朮加桂腎氣急燥去白朮恐作奔豚故加官

桂

若情多加茯苓

若腹瀉去白朮加附子

若飲酒過多或啖炙煖熱食發為鼻衄加川芎

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脈

○一論轉筋霍亂上吐下瀉腹內疼痛及乾霍亂俗名攪腸沙真陰症手

足厥冷宜服

理中丸

人參 乾薑炮

白茯苓 去皮甘草 炙各等分

右為末煉蜜為丸每重一錢細啗淡薑湯下忌食米湯此即理中湯改  
為丸取土能塞水之義若仍煎湯則不効矣

○一論乾霍亂者俗名攪腸沙其症因宿食不消心腹攪痛欲吐不吐欲  
瀉不瀉揮霍極亂所傷之物不得出洩故也死在須臾急宜多灌薑湯  
探吐之令物出盡却服理中湯或理中丸亦可更刺十井出氣并委中

出血

○一霍亂身熱口渴此熱暑中也宜

加減茹苓湯

猪苓

澤瀉

香茹

乾薑各七

赤茯苓一錢

天花粉二錢

白朮去蘆

黃連

各五分

甘草三分

右判一劑生薑煎服○如熱極加石膏知母○泄極加升麻滑石○腹痛加炒芍藥五分桂三分寒瀉亦加此

○一霍亂吐瀉用生薑細切以新汲水調益元散頓熱服之立止

○一論霍亂吐瀉因飲冷或冒寒或失飢或太怒或乘車舟傷動胃氣

人上吐下瀉不止頭暈眼花手足轉筋四肢厥冷用藥遲緩須臾不收

百沸湯

吳茱萸五錢木瓜五錢

食鹽五錢

右三味同炒焦用百沸湯煎隨病人意冷熱服之

○一方用枯白礬為末每服一錢百沸湯點服

○一治傷食吐瀉腹脹

順逆丹

白朮去蘆

白茯苓去皮 陳皮

川厚朴去皮 澤瀉各一兩

猪苓八錢

蒼朮米泔浸 神麴炒七錢

麥芽炒七錢 砂仁三錢

木香二錢

甘草炙五錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每一丸米湯研化下

○一治脾虛氣陷吐瀉煩渴用

參朮散

人參

白朮炒

白茯苓去皮 懷山藥

藿香

葛根

升麻

右為細末每服二錢米湯調下

○一論霍亂已愈煩熱多渴小便不利宜

麥門冬湯

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮

陳皮

半夏

姜炒

麥門冬 去心 甘草

小麥

烏梅

右剉生薑五片水煎溫服

○一論乾霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣欲絕者

鹽一大把炒令黃入童便一碗溫和服之少頃吐下即愈

○一治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽二碗布包紗護頓其臍前并腹肚上截以熨尋火氣透則愈

續又以炒鹽熨其背則十分無事

○一治霍亂轉筋用皂角末吹入小豆入鼻中得嚏即愈

○一霍亂轉筋用太麥下搗煎湯盪洗北人以麥糖代之使腠理開洩陽

氣散以愈也河間云熱氣燥燥於筋則攣懣而痛也

○一轉筋入腹欲死者生薑下兩搗爛以酒五盞煎服

○霍亂上吐下瀉 鄧對峰傳

用韭菜搗汁一盞重湯煮熱服之立止。

○霍亂吐瀉腹痛服藥即吐無法可施

用百沸湯半碗并泉水半碗合而服之即安名陰陽湯極效。

○霍亂吐瀉。

樟樹皮一把水煎服立止。

○一論霍亂不拘寒暑吐瀉不出腹痛煩燥謂之乾霍亂死在旦夕

病人腿腕橫紋上蘸溫水拍打紫紅脉見以布針或壁針刺破出血即愈。

即愈。

○一治霍亂吐瀉。

藿香梗丁味煎水服立效一方加陳皮尤妙。

嘔吐

脉滑數為嘔代者霍亂微滑者生清數凶斷

嘔吐者飲食入胃而復逆出也。有聲無物謂之噦。有物無聲謂之吐。嘔吐謂有聲有物。胃氣有所傷也。中氣不足所致。有外感寒邪者。有內傷飲食者。有氣逆者。三者俱以藿香正氣散加減治之。有胃熱者。清胃保中湯。有胃寒者。附子理中湯。有嘔噦痰涎者。加減二陳湯。有水寒停胃者。茯苓半夏湯。有久病胃虛者。比和飲。醫者宜審而治之也。

藿香正氣散方見霍亂治諸嘔吐照後加減

○一論外感寒邪嘔吐者依前方

○一論內傷飲食嘔吐者依前方加砂仁山查神曲

○一論有氣逆嘔吐者依前方加木香砂仁白豆蔻

○一論胃虛有熱作嘔吐者依後方

清胃保中湯

藿香一錢

白朮土炒

陳皮八分

半夏姜炒

白茯苓去皮

砂仁 三分

黃連 二錢

黃芩 二錢

梔子 二錢

甘草 二分

加批杷葉 去穢

右剉丁劑生薑三片長流水和黃泥攪勻清二鍾入藥煎至一鍾

服○吐逆甚加伏龍肝丁塊○因氣加香附炒一錢枳實炒八分

白朮○心煩不寐加竹茹○酒傷脾胃加乾葛天花粉白豆蔻

○一論嘔噦痰涎者

加減二陳湯

陳皮

半夏 薑炒

白茯苓 去皮

甘草

人參

白朮

竹茹

砂仁

山梔 炒

麥門冬 去心

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎徐徐溫服

○一論水寒停胃作嘔吐者

茯苓半夏湯

茯苓 去皮

半夏 薑炒

陳皮

蒼朮 米泔浸厚朴 薑炒各



砂仁五分

藿香八分

乾薑炒三分 烏梅一箇

甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎徐徐服

○一論陰症嘔吐或手足厥冷腹痛屬虛寒冷甚者附子理中湯方見中寒門

○一論久病胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食即嘔聞藥亦嘔者比和飲

人參 錢

白朮 錢

白茯苓 錢 藿香五分

陳皮 五分

砂仁五分

神麴 錢

甘草三分炙

右剉一劑用陳倉米一合順流水二鍾煎沸泡伏龍肝研細攪濁澄清取一鍾生薑三片棗二枚同煎七分稍冷服別以陳倉米煎湯時服之日進藥二三服即止神效

一論卒暴嘔吐虛弱困乏無力及久病人嘔吐飲食不入口即吐者人參一兩切片水煎徐徐服之立止

○一治胃氣冷吃食即欲吐白豆蔻五錢為末以好酒下三錢微溫調服目  
三錢。

○一治冷涎嘔吐陰症乾嘔。

吳茱萸湯

生薑五錢

人參三分

大棗五箇

右剉水煎食前服。

○一治患嘔吐聞藥即嘔百方不効以伏龍肝為末水元寒兩匙對服  
對症藥遂不再吐如神。

○一治熱症嘔吐或增寒發熱口苦。

小柴胡湯多加生薑人參須分兩或加烏梅

○一治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是

竹茹湯

半夏薑汁浸乾葛

青竹茹

甘草生

右剉薑棗煎服或加前胡

○一治嘔吐屬熱者

黃連一錢

石膏二錢

右為末白滾水送下

○一治熱嘔不止

梔子炒黑

朴硝各等分

右為末每服一二匙白滾水送下

○一論太腸結燥嘔吐不止湯藥不入老人虛人多有此症幽門不通上冲穀門嘔吐泛滿之症法須先以蜜導前通其幽門然後服藥蓋人身之氣上下週流不通必宜其上如前吐法是也上不安必轍其下也

藿香

厚朴

姜炒

陳皮

白木

去蘆炒半夏姜製

白茯苓

去皮

砂仁

各五分

枇杷葉去毛

甘草三分

生薑

一錢

右坐水煎服

○一治嘔吐宿滯，脘腹脹滿，手足俱冷，脈微細，用附子理中丸二服，益甚。

○一論陰虛於下，冷入多嘔者，乃諸陽氣浮無所依，從故嘔咳上氣，喘以六味地黃丸，用鹽湯送下。

○一嘔吐不食，腹痛後重，自用太黃等藥下劑，腹痛益甚，自汗發熱，煩渴，脈大，予用參朮各一兩，炙甘草煨薑各三錢，升麻一錢，水煎服而愈。又用益氣湯加炮薑二劑而愈。

**翻胃**

脉浮緩者生，沉濇者死。○脉濇而小，血不足，脉大而弱，氣不足。

天翻胃之症，其來也未有，不由膈噎而始者，膈噎者，喜惡不常，憂思勞役，驚恐無時，七情傷於脾胃，鬱而上痰，痰與氣搏，升而不降，飲食不下，血氣留於咽嗑，五噎結於胸膈者，為五膈。法當順氣化痰，溫脾養胃，如陽

脉緊而澀者爲難治之症。夫審胃即膈噎。膈噎乃審胃之漸。太夫有四  
血虛。氣虛。有痰。有熱。血虛者脉必數而無力。氣虛者脉必緩而無力。氣  
血俱虛者則口中多出沫。但見沫大出者必死。有熱者脉必數而有方。  
有痰者脉必滑數。二者可治。血虛者則以四物湯爲主。左手脉無力。氣  
虛者則以四君子爲主。右手脉無力。糞如羊屎者。斷不可治。大腸無血  
故也。痰以二陳湯爲主。寸關脉沉或伏。或大有氣結滯。通氣之藥皆可  
用。寸關脉沉而澀。大不可用。香燥熱劑。宜薄。滋味。又曰。膈噎審胃之疾  
得之六淫七情。遂有火熱炎上之作。多升少降。又有外感除火。上炎。審  
胃者。作陰火治之。太便必結。用童便。竹瀝。韭汁。薑汁。牛羊乳。分氣而用。  
○一論膈有十般之病。其實同出於一源。皆因動性不能收洩。則鬱於肝  
人之膈膜屬肝木。否則木乘土位。木曰曲直。作酸。酸則能收。其胃  
腕因之而收。小室碍乃作膈。宜用此湯。

當歸活血潤膈湯

當歸

錢五分

桃仁

去皮尖 錢一

廣陳皮

清色者 八分

川厚朴

薑炒 錢一

黃連

湯炒 錢一

大腹皮

甘草湯洗 錢一

紅花

七分

片白木

薑水炒 七分

炙甘草

三分

善酒者加葛根

七分

右剉子剉水煎服

按五噎名雖有五原其要在於氣弱血枯之人思慮勞慾而成者也氣弱則運化不開血枯則道路閉溢蓋心生血腎生氣任脈乃陰之海若則精竭任脈不潤矣任脈循咽嗑胸中胃之三腕下直而下腎虛則胃田清氣不升故中焦乏順下之化脾雖思味而愛食因升降不調而成噎矣宜絕慾以復精血須節酒志以和心脾用當歸活血潤腸湯去白朮加入麥一錢白豆蔻七角黃柏酒炒七分知母七分梔子炒一錢瓜蒌仁炒一錢遠志甘草湯去心八分紅棗三枚水煎服

○一論膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯此能推陳致新治膈氣之聖藥也

人參利膈丸

人參三錢 當歸二錢 藿香一錢五分 厚朴二錢姜汁炒 枳實製炒之酒

大黃一兩酒蒸 木香一錢五分 檳榔一錢五分 甘草二錢炙

右為末滴米為丸如梧子大每服五十丸溫水下

○一論噎食轉食宜

加減不換金正氣散

蒼朮米泔浸陳皮去白 厚朴姜汁炒 藿香 半夏姜汁炒

枳實製炒 白朮去蘆 白茯苓去皮 白豆蔻去殼 甘草

黃連土炒

右剉生薑三片水煎服

○一論噎膈者胃之症皆由七情之氣太過鬱則生火生痰而致病初則耗氣耗血以致虛氣虛不能運化而生痰血虛不能滋潤而生火或胡食而暮吐或暮食而朝吐或食已即吐者日久不愈候候香燥攻剋之藥

過多以致危殆宜以

補中益氣湯方見內傷依本方去柴胡升麻加半夏白茯苓白芍酒炒枳

實熬炒神麴炒黃連薑炒

○一番胃不食脾胃虛弱不進飲食宜

太倉丸

丁香

砂仁

白豆蔻去壳陳倉米黃土炒米熟

右為細末生薑自然汁為丸如梧子大每服百丸食後用淡薑湯送下  
有怒氣加香附子姜汁炒

○一論五噎者氣鬱勞食思也

氣噎者心悸上下不通噎噦不徹胸膈苦痛

憂噎者天際苦厥逆心忤悸動手足厥冷

勞噎者黃氣隔脇下支滿胸中填塞冷言足逆冷不能自溫

食噎者食無多少胸中苦寒常痛不得喘息



思噫者。心悸動喜忘。目視恍惚。有夢遺。噎氣。寒氣上攻。胸膈。

五噎丸 治胸中虛寒日久。噎逆逆氣。飲食不下。結氣未消。

人參五分

白朮四分

白茯苓四分

陳皮六分

細辛四分

川椒五分

吳茱萸五分

桂心五分

乾薑五分

大附子去皮

右為末。煉蜜為丸。如梧子大。每服三丸。酒下。日三次服。

保和丸 治胃熱。蓄胃。

陳皮

半夏薑汁炒 白茯苓去皮 連翹

神麴炒

山查肉

蘿蔔子炒

黃連薑炒 五錢

右為末。稀米糊為丸。胭脂為衣。每服六七十丸。人參煎湯下。

○一論胃反不受食。食已即嘔吐出。

人參二兩

白朮去蘆

半夏湯洗

生薑三兩

白蜜一兩

右五味。以水五升。和蜜。揚之二三次。煮取一升半。分三次服之。

○一論反胃嘔吐無常。粥飲入口即吐。困弱無力。至死者。

人參二兩咀片水煎頓服立効再用入參汁煮稀粥與服

○一治番胃用六君子湯加炮薑白豆蔻黃連用吳茱萸酒拌過宿炒去

○一治轉食方

反芻雞一隻煮熟去骨入人參當歸鹽各五錢為末再煑取粟食之勿令人共食

○一人年過五十得噎証胃脘作痛食不下或食下良久復出太便秘燥人黑瘦甚珍其脈右關弦滑而洪關後略沉小三部俱沉弦帶此中氣不足木來侮土上焦濕熱鬱結痰下焦血少故太便秘燥除痰上衝吸門故食不下用四物湯以生血四君子湯以補氣二陳湯以祛痰三合成劑加薑炒黃連炒枳實枯蕤仁少加砂仁又間服潤腸丸百餘劑全安潤腸丸方見大便秘

○一治番胃

用大附子一個最入者坐於磚上四面着火漸逼漸入生薑自然汁

又依前火逼乾復添之約生薑汁可盡半碗許搗為末每服一錢用粟米湯下不過三服立效

○一治噎膈大便燥結

橘杏麻仁丸

陳皮為末

杏仁

去皮尖

火麻仁

去壳各

郁李仁

去壳

右三仁俱搗為膏用聚肉和入石臼內杵為丸每服五十九粒實煎湯

送下

飢逆

脉浮而緩者易治弦急而按之不鼓者難治○脉結或促或微皆可治○

脉代者危○右關脉弦者木乘土位難治

發飢者氣逆上衝而作聲也一名欬逆因氣逆奔急上行作吐發聲有數者不同不可不辨有胃虛膈熱者宜橘皮竹茹湯有胃虛寒者宜丁香

柿蒂湯有腎氣虛損陰火上升者宜六味地黃丸有冲氣不足尿虛數氣不相續而發飢者宜補中益氣湯加生脉散黃柏以降虛火或先加附子服之立愈有陽明肉實失下而發呃者宜六一順氣湯下之通瀉而飲水太過成水結胸而又發呃者宜小陷胸湯或用小青龍湯去麻黃加附子治水寒相搏發呃太妙有傳經傷寒熱症誤用薑桂等熱藥助起火邪痰火相搏而為逆者宜黃連解毒湯白虎湯及竹瀝湯

○一論飢逆因吐利後胃虛膈熱而欬逆者

橘皮竹茹湯

陳皮

去白二錢

人參一錢

甘草

炙一錢

竹茹一錢

加柿蒂一錢

丁香

五分

右剉丁剉生薑五片棗二枚水煎溫服身熱發渴加柴胡黃芩去丁香  
○一論吐利後太病後胃中虛寒欬逆至七八聲相連收氣不回者薤白丁香柿蒂湯

人參 白茯苓 陳皮 良薑 丁香 柿蒂各一錢

甘草 五分

右剉一劑生薑五片水煎服。

○一論欬逆而無脈者用。

人參復脈散。

人參 白朮 去蘆 麥門冬 去心 白茯苓 去皮 五味子

陳皮 半夏 姜炒 竹茹 甘草

右剉生薑五片水煎服。

○一論人因飲食後得氣發脈逆連聲不止者宜。

順氣消滯湯。

陳皮 半夏 姜炒 白茯苓 去皮 丁香 柿蒂

黃連 姜炒 神麴 炒 香附 白朮 竹茹

甘草

右劉生薑五片水煎服。

○一論腎氣虛損虛火上衝而作欬逆者自膝下上衝直出于口者陰火  
上衝難治

六味地黃丸

方見補益

依本方作湯加柿蒂沉香木香砂仁

○一論中氣不足

脈虛微氣不相接續而作欬逆者宜

補中益氣湯

方見內傷

依本方加麥門五味黃柏

酒炒少加熟附子

○一論傷寒陽明內實朱下而發呃逆者用

六一順氣湯

方見傷寒

○一治傷寒發熱而呃逆者用

黃荊子炒不拘多少水煎服。

○一論傷寒發渴而飲水太過成結胸而發呃逆者用

小陷胸湯

黃連二錢

半夏長如

瓜蒌實二錢

右劉生薑三片水煎服。

一論傷寒表症未解，心下有水氣乾嘔欬逆，又治受寒喘嗽，以小青龍湯。

桂枝

乾薑

細辛

半夏

芍藥

五味子

熟附子

甘草

右剉水煎服。

一論傷寒陽症，呃逆潮熱，小柴胡湯加生薑、竹茹、橘皮。

一論有傳經傷寒，誤用薑、桂等熱藥，助起痰火，而作呃逆者，用

黃連解毒湯。方見戒口白虎湯。方見傷寒

一論因服攻病藥，致傷胃氣，下陷而元氣將離，以致胃氣共并出之氣

疲斃，或名病人而至於呃者，乃三焦元氣與胃氣相戾，乃危惡之兆也。

宜用。

大補元湯。

嫩黃芪

蜜水炒棟參 去蘆一分

白朮

去蘆炒

懷山藥

一錢

廣陳皮 七分

石斛 七分

白朮仁 研六分 廣木香 三分

沉香 三分

甘草 炙七分

右判一劑生薑三片紅棗二枚粳米一撮水煎不拘時溫服

○一論一切呃逆用柿蒂燒存性為末酒調服立止一方每服用柿蒂七箇焙為末黃酒調下

○一服法治呃逆服藥無効者用硫黃乳香各等分為末以酒煎能治惡人難治

○一方用雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人飲其熱氣即止

○一灸呃逆法見多法

○一治噦逆欲死者其肺脈弱者不治用半夏生薑各一兩每服五錢水

煎服

○一治咳逆連咳四五十年者

生薑汁半合蜜一匙與煎合熱溫服如此三服瘥



噎氣

脉噎氣噎雜密右寸關緊滑可治弦急則難兩寸弦滑留飲胸間脉橫在寸有積上欄

夫噎氣者胃虛火鬱之所成也因胃中有火治療之法虛則補之熱則清之氣則順之氣順則痰消也

○一論噎氣者胃中有火有痰也宜用

星半湯

南星

半夏

石膏

香附

炒梔子

各等分

右剉丁剉生薑煎服或以鹽汁糊作丸亦可蓋胃中有鬱火膈上不利痰故也

○一論噎氣聲聞於外因氣膈膈悶有痰舌黑乃痰之症也宜服

道痰湯

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

白朮去屑

香附

青皮去穢

黃芩炒

黃連姜炒

瓜蒌仁

砂仁

甘草

右劉生薑三片水煎服

○一論婦人嘔氣胸緊連嘔十餘聲不盡嘔出氣心頭略寬不嘔即緊此破鬱丹

香附醋黃

梔子仁炒四兩

黃連姜汁炒

枳實炒

檳榔一兩

莪朮煨一兩

青皮去穢

瓜蒌仁一兩

蘇子一兩

右共為末水丸如梧子大每服三十丸食後滾水送下或以分心氣飲

服之立効

○一上合飲食失宜胸膈膨脹嘔氣吞酸以自知醫用上陳枳連蒼柏之類前症益甚更加足指腫痛指縫出水余用補中益氣加茯苓半夏治之而愈若腿足浮腫或炊腫寒熱嘔吐亦用前藥

# 吞酸

脉弦而滑，或浮而弦，或浮而滑，或沉而遲，或沉而洪，或洪而數，或沉而遲，胸中有寒飲，或數者，痰熱在胸膈，時吐酸水，飲成潮胃也。

夫酸者，肝水之味也。由火盛制金，不能平木，則肝木自甚，故為酸也。如候食熱，則易於酸矣。或言吐酸為寒者，誤也。乃濕熱在胃，口上酸，食入胃被濕熱鬱遏，食不得化，故作吞酸。如穀肉覆蓋在器，濕則易為酸也。必用吳茱萸，順其性折之，乃在活法。

○一論吞酸，諸雜酸水刺心者，乃痰火鬱氣也，宜

清鬱二陳湯

陳皮

半夏 薑炒

茯苓

梔子

錢炒 各一

蒼朮

米泔炒

川芎

白芍

炒 七分

甘草

三分

香附

黃連

薑炒

枳實

炒 各八

神麴

炒 五錢

右劉下劑生薑煎服。

○一論鬱積吐酸者用

朱連丸

蒼朮米泔浸陳皮一兩

半夏姜炒

白茯苓去皮黃連二兩半姜炒

吳茱萸炒一兩冬月倍用

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服三五十九食後白滾湯送下

○一論噫氣吞酸體維有痰有熱有氣有食胸膈不寬飲食不化以

香薷和中丸

白朮去蘆炒山楂肉

連翹各四兩白茯苓去皮半夏姜汁炒

枳殼去穢陳皮去白

神麴炒各二兩乾生薑二兩萊菔子炒

白豆蔻炒各五錢木香二錢五分

右為細末神麴糊為丸如梧子大每服百丸食後白湯送下

○一論婦人心酸乃痰飲積在脾胃間時時酸心或吐水宜

吳茱萸丸

大麥芽炒五錢肉桂五錢

吳茱萸一兩 湯洗蒼朮一兩 湯洗

陳皮五錢 去白

神麴炒五錢

右為細末。水煮稀麵為丸。如梧子大。每服五七十九粒。飲送下。

一論醋心。每醋氣上攻。如醋醋不可留者。用吳茱萸一合。水一鍾煎七

分。頓服。縱濃亦須強飲。曾有人心如蠶破。服此方效。

一治口吐清水用

蒼朮

壁土 炒

白朮

去蘆 炒

陳皮

白茯苓

滑石

炒

水煎服

一儒者四時喜極熱飲食。或吞酸噯腐。或大便不實。足指絳。滿此脾

氣虛寒。下陷。用六君子加薑桂治之。而愈。稍為寒宜。諸疾仍作。用前藥更

加附子錢許。數劑不再發。

一婦人吞酸噯腐。嘔吐痰涎。面色純白。或用二陳黃連枳實之類。加姜

熱作瀉。肚腹脹滿。予曰。此脾氣虧損。未傳寒中。不信。仍作火治。服薑脾

服如過余以六君加附子木香治之胃氣漸醒飲食漸進虛火歸經又  
以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏兼服全愈

○一治食後吐酸水用乾薑吳茱萸各二兩爲末每服方寸匙酒調服  
二服日冷服之立効

# 餽雜

夫胃爲水穀之海無物不受若夫濕麵魚膽水果生冷以及烹飪調和指  
滑難化等物恣食無節朝傷暮損而成清痰稠飲滯于中宮故胃氣難  
受氣吞酸痞滿甚則爲胃脘痛即此之由也夫餽雜之爲症也以飢  
不飢似痛不痛而有懊懷不自寧之況者是也其症或兼噯氣或兼痞  
滿或兼惡心漸至胃脘作痛實療久之爲患也治法以南星半夏橘紅  
之類以消其痰苓連梔子石膏知母之類以降其火蒼朮白朮芍藥之  
類以健脾行濕壯其本元又噯忘口即然無有不妥者也

○一論傳雜乃痰因火動也宜化痰清火湯

南星薑炒半夏 薑炒陳皮

黃連

黃芩

梔子

知母

石膏

蒼朮

米泔浸

白朮

去蘆炒

白芍

甘草

右劉生薑煎服

○一論傳雜因血虛而作者宜

養血四物湯

當歸

川芎

白芍

熟地

黃煨人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮半夏

姜炒黃連

姜炒梔子

炒

甘草

一方去人參加香附貝母

右劉生薑煎服

○一論婦人心胸傳雜多是痰症或云是血餽而用猪餘血炒炙之可愈此以血道通歸原平此方治中脘心腹冷痰心下嘈雜口出清水脇肋

急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷脉沉遲弦細宜此

旋覆花湯

陳皮

半夏

姜炒

赤茯苓

人參

白芍

細辛

桔梗

官桂

甘草

右剉生薑七片水煎服

○一論婦人心中膈雜用

茯苓補心湯即四物湯合參蘇飲是也

○一治心中膈雜坐臥不安蔡完體傳

陳皮一錢

半夏八分

白茯苓一錢

赤茯苓

八分

酸棗仁炒八分

益智仁三分

麥門冬

去心

甘草二分

右剉下剉生薑煎半空心溫服

○一人多思慮以致血虛五更時膈雜是也宜以

四物湯加香附山梔黃連貝母



○一肥人儲雜宜用

二陳湯少加撫芎蒼白木炒梔子水煎服

○一論儲雜者痰火內動如粗食在膈令人不自安也用

痰火越鞠丸

海石 研水飛 膽星

瓜蒌仁

去油 山梔 炒黑

青黛 水飛過

香附 童便浸 蒼朮

米泔浸透 槌去 黑皮切片炒

撫芎

右各等分爲細末湯泡蒸餅爲丸如菰豆大每服百丸臨臥白湯送下

○一論儲雜屬鬱火者宜

加味三補丸

黃芩 去朽

黃連 去尾

黃柏 去皮童便炒

香附 米醋浸

炒

蒼朮 米泔浸透 槌去 黑皮切片炒

右各等分爲細末水杓稀糊爲丸如菰豆大每服七八十丸臨臥茶清送下

送下

# 諸氣

脉下手脉沉便知是氣沉極則伏瀋弱難愈其或沉滑氣將痰飲病也。入稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其形。一氣周流于其中以成其神。形神俱備乃為全人。故氣陽而血陰灌溉周身而無一毫之閒斷也。血則隨氣而行。氣載于血者也。有是氣必有是血。有是血必乘乎是氣。二者行則俱行。一息有閒則病矣。今之人不知忿怒驚恐悲哀而損其身。憂愁思慮以傷其氣。故人之疾多從氣而生。致有中瀯腹脹積聚喘急五膈五噎皆由于氣也。

○一論男子婦人一切氣不和。多因憂愁思慮忿怒傷神。或臨食憂戚。或事不隨意。使抑鬱之氣留滯不散。停於胸膈之間。不能流暢。致心膈痞悶。脇肋虛脹。噎塞不通。噎氣吞酸。嘔噦惡心。頭目昏眩。四肢倦怠。面色痿黃。口舌乾苦。飲食減少。日漸羸瘦。或木腸虛閉。或因病之後。胸中痞

痞不思飲食並皆治之

分心氣飲

青皮去穢

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮木通

官桂

赤芍

桑白皮

大腹皮

紫蘇

羌活

甘草

右剉作劑生薑三片棗二枚擘心十根水煎溫服○性急加柴胡○多  
怒加黃芩○食少加砂仁神麴○咳嗽加桔梗半夏○胸膈痞悶加枳  
實香附○三焦不和加烏藥○氣閉加蘿蔔子枳殼○氣滯腰疼加水  
瓜枳殼○上焦熱加黃芩○下焦熱加梔子○翻胃加沉香磨服○水  
氣面目浮腫加猪苓澤瀉車前木瓜葶藶麥門冬○氣塊加三棱莪朮  
○一方去赤芍羌活加枳殼桔梗木香檳榔香附莪朮藿香治憂思鬱  
怒諸氣

○一論七情之氣結成痰延狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出吞

不下或中脘痞悶氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲惡心嘔吐等症

加味四七湯

半夏湯泡

白茯苓

去皮

川厚朴

薑炒

紫蘇

二兩

桔梗

二兩

枳實麩炒

甘草

一兩

右剉作十劑生薑七片棗丁枚水煎熱服。一方治梅核氣加檳榔。

○一論一切氣滯心腹滿悶疼痛脇肋脹滿難消嘔吐酸水痰涎不利頭目昏眩并食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大小便結滯不快風壅積熱口苦煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通經治氣分之聖藥也宜此

利氣丸

大黃

生用

黑丑

頭末

木香

一兩

檳榔

一兩

枳殼

麩炒

香附米

炒

青皮

去核

陳皮

一兩

義木

煨

黃連

一兩

黃柏三兩

右為細末，水丸梧子大，每服五七十九，或百丸臨臥淡薑湯送下，以利為度，如不利，再加丸數，通利則愈。瑞竹堂加黃芩、當歸各二兩。

○一論脾胃不和，過食生冷，油膩麵粉濕麵，停滯不化，腹脹滿悶，嘔逆惡心，腹脇膨脹，心脾疼痛，增寒壯熱，或面目四肢浮腫，其致臟腑閉滯，上氣喘急，睡臥不安，但是有因氣所傷，寒氣咽氣，腸氣滯氣，寒氣瘧氣，瘧氣氣塊，丁切氣並治用此。

沉香化氣丹

- |     |     |      |     |     |    |     |    |     |
|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 香附子 | 一片  | 炒肉   | 黑牽牛 | 頭末  | 蒼朮 | 米泔浸 | 青皮 | 去穢炒 |
| 陳皮  | 五兩  | 四兩生用 | 山藥  | 二兩  | 枳殼 | 麩炒  | 枳實 | 麩炒  |
| 厚朴  | 薑汁炒 |      | 三稜  | 煨三兩 | 莖朮 | 煨二兩 | 紫蘇 | 二兩  |
| 木香  | 一兩  |      | 沉香  | 七錢  | 丁香 | 二兩  | 丁皮 | 二錢  |
| 官桂  | 五錢  |      | 乾薑  | 炮一兩 | 良薑 | 一兩  | 砂仁 | 二兩  |

草果

去壳一兩五錢

白豆蔻

去壳一兩

南星

炮一兩

半夏

炮一兩

人參

五錢

白茯苓

去皮一兩

檳榔

一兩

石菖蒲

二兩

薤白

二兩

神麴

炒一兩

山查

去子二兩

右為細末，醋糊為丸，如梧子大，每服五十丸，臨臥淡薑湯送下，物疏布氣，空心鹽湯下，如要大便通利，漸加至百丸，初看老幼盛衰，增減其數，此藥蠲積聚，化滯氣，逐風寒，原立見神効，寒性溫平，不損元氣，常服五九，疎風順氣，利胃健脾，消滯，伏食，寬中快膈，消磨痞塊，孕婦不宜服。○一論男婦中風，中氣，牙關緊閉，口眼喎斜，不省人事，并傳屍骨蒸，癰瘰，奔暴，心疼，鬼魅，疰，瘡，小兒急慢驚風，婦人產後中風，赤白痢疾，一切急暴之症，最能順氣化痰，神効。

蘇合香丸

沉香

木香

丁香

白檀香

安息香

酒浸

麝香

香附米

白朮

去蘆

訶子肉

草撥

犀角

剉屑

朱砂

研一兩

蘇合油

入安色...

右將各味咀成片，得細末，入膠巖，安息香，蘇合油，同藥攪勻，煉蜜丸，每丸秤過一錢，用蠟包，每用大人一丸，小兒半丸，去蠟皮，以生薑自然汁化開，擦牙關，另煎薑湯少許調藥灌下。

○一人飲酒太醉，後氣往外，仰頭出，不盡有出氣無收氣，此乃氣不歸元，死在須臾，諸藥不効，余以

葦葉根，槌損入陳醪，醪炒熟，絹包，浸臍下，此一包冷，又另換一包，浸臍下，泄氣漸降而歸元矣，妙不可言。

# 痞滿

脾來堅實者順，虛弱者逆。

痞滿與脹滿不同，脹滿內脹而外亦形痞，則內覺痞悶而外無脹急之形也。蓋由陰伏陽蓄，氣血不運，而成位心下之止，脹滿痞塞皆土邪之所

為耳有因誤下。真氣虛而入於心之分野。有因食積。而氣滯於  
行。而作痞者。有濕熱太甚。土來心下。而為痞者。治之用黃連。黃芩。枳實  
之苦。以泄之。厚朴。生薑。半夏之辛。以散之。人參。白朮之甘溫。以補之。獲  
苓。澤瀉之鹹淡。以淡之。大槩與濕同治。使上下分消可也。  
○一論按之堅而軟。無塊。痞痞多是。痞氣鬱結。或飲食停滯者。  
加味二陳湯

陳皮

半夏 薑炒

白茯苓 去皮 枳實 薑炒

黃連 薑汁炒

山查 去子

木香

青皮 去穢

砂仁

甘草

右剉生薑煎服。

○一論痞滿宜調中補氣血。消痞清熱。攻補兼施。而當也。

平補枳朮丸

白朮

去腐土 炒三兩

白芍

酒炒一兩 五錢

陳皮

枳實 薑炒

黃連

酒炒各一兩

人參

木香

各五錢



右爲細末荷葉煎湯打米糊爲丸如梧子大每服五十九食遠米湯下漸加至六七十丸

○一論內傷元氣脾胃而作心下痞者宜大補元氣也服加減補中益氣湯方見內傷

如脉緩有痰而痞加半夏黃連○脉弦四肢滿悶便難而心下痞加黃連柴胡甘草○太便閉燥黃連桃仁少加大黃歸身○心下痞旁肉加白芍黃連○心下痞腹脹加白芍砂仁五味子○如天寒少加乾薑或肉桂○心下痞中寒者加附子黃連○心下痞嘔逆者加陳皮生薑黃連○冬月加黃連少加丁香藿香○能食而心下痞加枳實三錢黃連五分○如不能食心下痞者勿加之依本方食已心下痞則服前枳朮丸而愈

○一論丁切心下痞及年久不愈者宜用

大消痞丸

黃連六錢 土炒

黃芩六錢 土炒

枳實五錢 炒

半夏四錢 洗

陳皮四錢

厚朴四錢 炒

猪苓五錢 炒

澤瀉三錢

薑黃一兩

乾生薑二錢

人參四錢

神麴二錢 炒

砂仁三錢

甘草二錢 炙

白朮一兩 土炒

右為細末，蒸餅為丸，如梧子大，每服五十丸，漸加至百丸，空心白滾湯送下。

○一男子胸膈作痞，飲食難化，服枳朮丸，久而形體消瘦，發熱口乾，脈浮大而微，用補中益氣加桂薑諸症悉退，惟見脾胃虛寒，遂用八味丸補命門相火，不月而飲食進，三月而形體克此，症若不用前丸，多服腹脹喘促，腿足浮腫，小便淋瀝等症，急用加減腎氣丸，亦有得生者。

○一治痞悶氣積食積宜服

內消丸

青皮

陳皮

三稜煨

莪朮煨

神麴炒

麥芽炒

香附

炒各等分

右為細末醋糊為丸如梧子大每服三五十丸茶清送下

○一腹中窄狹須用蒼朮若肥人自覺腹中窄狹乃是濕痰流灌臟腑時氣不升降燥飲用蒼朮香附行氣如瘦人自覺胸中窄狹乃是熱氣薰蒸臟腑宜黃連蒼朮

○一論心下堅如盤者

枳實 燒一錢白朮 去蘆三錢

右剉一劑水煎服

補中益氣湯方見內傷八味丸方見補益

# 鼓脹

經云其脉太堅以瀉者脹也○關上脉浮則肉脹○遲而滑者脹○脉盛而緊者脹○脹脉浮大者易治虛小者難治水病腹大如鼓脉實者生虛者死洪大者生微細者死○中惡腹大四肢滿脉大而緩者生浮而

紫者死

丹溪云七情內傷六淫外感飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陰陽不交清濁相混隧道壅塞而爲熱熱留爲濕濕熱相生遂成脹滿經云鼓脹者是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若蟲侵蝕之義陰陽怱怱榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布脹滿之所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹謂之四病或寒或熱或虛或實又不可以無別也若久病羸乏卒病脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻數百方調治未見一愈者矣

朝寬暮急者爲血虛暮寬朝急者爲氣虛朝暮俱急者氣血俱虛

脉經曰胃中寒則脹滿此論內傷不足之邪乃久病也寒者非寒冷之寒乃陰虛之義故用參朮以補脾爲君蒼朮茯苓陳皮爲臣黃芩麥門爲使以制肝木少加厚朴以消腹脹氣不運加木香氣下陷加升麻柴胡

提之血虛加四物湯有痰加半夏經云寒因寒用者是也病脹久脾胃虛者雖有大小便不利之證乃氣不運血不潤也當大補氣血為主慎不可用下藥也鼓脹為病多端宜照後方加減調治毋得執泥以誤人也。

○一論病人初起心腹脹滿因于食傷脾胃濕痰氣鬱食積而作脹也用此通治之劑宜

香砂和中湯

藿香

砂仁

各一錢二分

蒼朮

炒一錢五分

厚朴

薑汁炒

廣陳皮

刮去白

半夏

薑汁炒

白茯苓

去皮

枳實

麩炒

青皮

去穢

神麴

炒

山楂肉

各一錢

白朮

去蘆

炒一錢半

甘草

三分

右剉一劑生薑煎服

○一論脾虛鼓脹手足倦怠短氣漉泄者此調治脹滿王道之藥久病虛弱之人宜服

六君子湯

人參

白朮去蘆炒 白茯苓去皮 半夏薑製

陳皮

甘草

右劉生薑煎服。一方加當歸白豆蔻蘇梗尤妙。

○按經曰寒因寒用故用補劑以治脹初服則脹久服則通此惟精達經旨者知之庸醫未足道也若朝寬暮急為血虛加當歸川芎暮寬朝急為氣虛依本方朝暮俱急亦加芍歸。

○一論男婦因於氣惱而心腹脹滿或痰嗽喘急者予常見因氣而作脹滿者甚多而用此方甚効可分心氣飲方見諸氣。

依本方加檳榔枳殼香附為藥。

木香消脹丸 治症同前。

木香二錢五分

檳榔五錢

陳皮

大腹皮

枳殼麩炒

桑白皮

蘇子炒

香附子炒

蘿蔔子炒

二兩

右為細末水煮稀神麴糊為丸如梧子大每服五七十丸淡薑湯送下  
○一論腹脹發熱以陽并陰則陽實而陰虛陽勝則外熱陰虛生內熱肝  
必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故固致脹滿者為  
之熱脹宜用

枳實分消湯

川厚朴去皮薑汁炒

枳實錢五分

大黃酒蒸一錢五分

官桂二錢

甘草炙一分

右剉一劑薑棗煎服嘔吐加半夏自利去大黃寒多加乾薑

○一論中滿鼓脹氣脹水脹熱脹宜

中滿分消丸

人參二錢五分

白朮去蘆半錢

薑黃一錢五分

猪苓去黑皮一錢

甘草炙一錢

砂仁

乾生薑各二錢

澤瀉

陳皮

知母去毛酒炒

各二錢

白茯苓

去皮二錢

枳實炒

半夏姜炒

黃連

姜汁各五錢

黃芩

酒炒六錢

川厚朴

姜炒五錢

右為細末。水浸蒸餅為丸。如梧子大。每服百丸。焙熱食遠白湯送下。

○一論老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脉浮遲而弱此名寒脹

香朴湯

川厚朴

姜汁炒五錢

大附子

炮去皮三錢八分

木香一錢五分

右剉一劑生薑七片棗二枚水煎熱服

○一論中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下

虛中滿腹脹心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收宜

中滿分消湯

益智

半夏姜炒

升麻

茯苓去皮

木香各三分

黃芪炒

吳茱萸炒

草豆蔻

川厚朴姜炒各五分

川烏炮

人參

澤瀉

青皮去穢

當歸

柴胡



黃連姜炒

澄茄

黃柏酒炒

乾薑

生薑各二分

右剉一劑水煎服忌房勞酒濕麵生硬冷物

○一論中滿腹脹內有積聚如石堅硬令人坐臥不寧二便澀滯上氣喘促或通身虛腫

廣茂清堅湯

川厚朴姜炒去皮

黃連姜炒

益智仁

草豆蔻

當歸各五分

廣木

升麻

紅花

柴茱萸各二分

柴胡

澤瀉

神麴炒

青皮去穢

陳皮各三分口乾加葛根四分

右剉一劑生薑煎食遠溫服忌酒醋濕麵

一論濁氣在上則生腹脹清氣在下則生飧泄宜

木香順氣湯

木香三分

厚朴姜炒四分

青皮去穢

陳皮

益智

澤瀉

乾生薑

茯苓

半夏

姜炒

吳茱萸

湯洗

當歸

蒼朮

各五分

升麻

柴胡

分

草豆蔻

三分

白朮一錢

右剉一劑水煎服忌生冷硬物

○一治鹽脹

黑丑頭末

木香

甘遂各一錢

右為末用猪腰一對俱分破將藥撒在一腰子內合住帛包灰火燒熟空心或食二箇或食一箇未便行膿血見效

○一論血鼓腹如盆脹積聚活塊宜

化癰丸

三棱

莪朮

乾漆

砂

黃蠟

糯米炒

水蛭

石炭

琥珀

牛膝

酒洗

肉桂

大黃

酒洗

右為末用生地黄黃白然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十丸

心溫滯下。童便亦可。

### 四炒枳殼丸

一治脾胃不和氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼四兩去穢切作二兩指有大塊分四處

一兩用蘿蔔子一兩炒去子不用

一兩用蒼朮四兩炒去蒼朮不用

一兩用乾漆一兩炒去乾漆不用

一兩用小茴一兩炒去茴香不用

右用原炒蒼朮四味用水二碗煎至一碗去渣熬稠為丸如梧子六每服五十丸食後米湯下。

## 水腫

水腫之症有陰有陽。察脈觀色問症須詳。陰脈沉遲其色青白不渴而瀉小便清澀脈或沉數色赤而黃燥糞赤溺兼渴為陽。水腫氣急而小

便澁。○血腫氣滿而四肢寒。

蠱症太要有二。曰單腹脹。曰雙腹脹。喘急氣滿腫而不安。四肢微腫。此單腹脹。因內傷七情所致。取効微遲。四肢浮腫。肚大身重。此雙腹脹。因外感風濕所致。取効甚速。又有水腫氣腫之分。以指腫處有陷陷起。隨起者氣腫。先須理氣。陷不起遲者水腫也。只須導水。立愈。凡入年四十已上。氣血壯盛者。得効之後。善自調攝。終身不發。五十以後。氣血稍衰。調攝不謹。時或再復。此藥尚能治之。但屢復屢治。而元氣耗則難為矣。脈浮洪易治。沉細難治。浮洪者。只用金不換木香丸。沉細者。兼用沉香快脾丸。先服木香流氣飲。

○一論諸氣痞滯不通。胸膈膨脹。口苦咽乾。嘔吐不食。或有背腹脇走注刺痛。及喘急痰嗽。面目虛浮。四肢腫滿。大小便閉澁。又治夢遺太過。怔忡驚悸。脚氣風濕。聚結腫痛。喘滿脹急。此藥調順榮衛。流通血脈。快利三焦。安和五臟。凡治蠱脹。當先用此。

木香流氣飲

木香五錢

丁皮五錢

藿香五錢

半夏錢湯泡二分

人參五錢

白朮五錢

赤茯苓五錢

厚朴二兩

青皮二兩

陳皮四兩

草果七錢

檳榔七錢

大腹皮七錢

香附二兩

紫蘇二兩

木瓜五錢

白芷五錢

麥門冬五錢

莪朮五錢

肉桂五錢

木通一兩

石菖蒲五錢

甘草二兩

右劉公錢生薑三片。棗二枚。水一碗半。煎至七分。去渣。熱服。本方加沉香。枳殼。大黃。去。藿香。石菖蒲。名。二十四味。流氣飲。○蠱腫加白豆蔻。○腫滿加黑牽牛。○頭面腫加葱白。○肚腹腫加枳實。倍。青陳皮。○臍至脚腫加桑白皮。

○一論金不換木香丸治蠱腫之神藥也。先服木香流氣飲三五劑。通加白豆蔻。次用金不換木香丸。收功。後用沉香化氣丸調理。或心頭煩熱者。竹葉石膏湯熱甚。加黃芩。前賢論蠱腫之症有五。不治者而黑如蠟。

肘太青筋掌腫無紋脚腫無坑臍中凸起此五疳亦能治之聞有得生  
者如取下黑水者不治陽事不舉者不治其餘青黃紅紫皆能治之又  
一証或腫或消或作泄瀉知脾弱即瀉名曰泔水橫流服此宜之其腹  
自消其瀉自止忌一切生冷毒物油鹽醬醋魚鮮鵝鴨房事等件一百  
日無有不效者

### 金不換木香丸

大戟 五錢

芫花

炒五錢

甘遂 五錢

黑丑

頭末二錢

巴豆

去壳半去半五錢

大黃 生五錢

青皮

去穢三錢

陳皮 五錢

南木香

五錢

青木香

五錢

胡椒

一錢

川椒

去日五錢

益智仁

五錢

檳榔

五錢

大腹皮

五錢

苦蕒

五錢

射干

三錢

桑白皮

五錢

木通

去皮五錢

澤瀉

五錢

連翹

五錢

砂仁

五錢

右三十二味爲末醋煮麴爲丸如梧子大每服五十九壯歲人加七  
八十九第一消頭面腫五更初用葱白酒送下第二消中脘胸腹腫五

更初用陳皮湯送下第三消臍已下脚腫五更初桑白皮湯送下

沉香快脾丸

青皮 四錢

陳皮 四錢

三棱 煨 四錢

莪朮 煨 四錢

白朮 去蘆 四錢

白茯苓 四錢

砂仁 四錢

草果仁 四錢

木香 四錢

沉香 二錢

丁香 三錢

藿香 四錢

軍薑 三錢

肉桂 三錢

連翹 四錢

商陸 四錢

黑丑 四錢

大腹皮 二錢

神麴 四錢

麥芽 四錢

益智仁 四錢

雄附子 五錢

右二十四味為末麵糊為丸如梧桐子大每服三四十丸開水用之第一五更葱白湯下第二五更陳皮湯下第三五更紫蘇湯下第四五更

桑白皮湯下

沉香化氣丸

治濕常服調理

青皮 去穢

陳皮

三棱 煨

莪朮 煨

人參

白朮 去蘆

白茯苓

山藥

砂仁

白豆蔻

丁香

木香

沉香

檳榔

石菖蒲 各六錢

官桂 一兩

蘿蔔子 二兩 黑丑 頭末二兩 八錢

右為末，醋糊為丸，如梧子大，每服五七十丸，鹽湯下。

○一治前証服藥，忌鹽醋，一百日之後，用藥開鹽法。

猪苓

澤瀉

白朮

白茯苓

肉桂

鹽 各等分

右每用七錢，用鯽魚一箇，破肚，去淨，將前藥入魚肚內，加麝香少許，入瓦內，火焙黃色，存性，為末，鹽漿湯調服。

○一論腹脹緊硬如石，或陰囊腫大，先用甘草煎湯一鍾，熱服之後，即用此藥數之。

大戟

芫花

甘遂

海藻 各等分

右為末，醋糊和藥塗腫處，一加椒自尤効。

○按右諸方治諸鼓脹腫滿，殊効，其中有病人氣血虛，不敢服者。



又有服之而不効者此皆得病日久或悞投攻擊太過以致脾腎元氣虛損之極宜服後諸方實有起死回生之功也

○一凡看蠱識症○一朝腫暮消是陽蠱○二朝消暮腫是陰蠱○三腫上青筋起氣喘潮熱是氣蠱○四四肢不收無肉肚大是食蠱○五遍體肚不脹是翳油蠱○六遍身潮熱是脾蠱○七房室過多是腎蠱○八泄瀉潮熱是脾蠱○九飢墜上下小便不通是胃蠱

○一論水腫四肢頭面皆浮而腫或單腹鼓脹皆屬脾虛不能制水氣蠱不能運化治之補元氣養心血健脾胃以培其本清濕熱平肝木利水道以治其標此藥主之

行濕補氣養血湯

大揀參去蘆不油白朮去蘆陳皮

白芍酒炒白茯苓蘇梗

蘿蔔子炒海金沙木香

當歸川芎

厚朴姜炒大腹皮

木通甘草

右劉薑棗煎服。○氣虛倍參苓朮。○血虛倍芎歸芍。○小便短少加猪苓澤瀉滑石以消其腫也。○服後腫脹俱退惟面足不消此陽明經氣虛倍用白朮茯苓。

○一論單腹蠱脹只宜補中行濕利小便切不可下耳用行濕補中湯。

人參八分 白朮錢炒 白茯苓一錢 蒼朮米泔浸 陳皮一錢

厚朴錢 黃芩八分 麥門冬去心 澤瀉五分

氣不運加木香木通氣下陷加柴胡升麻

朝寬暮急血虛加當歸川芎白芍炒 香附黃連姜炒 去人參

朝急暮寬氣虛倍參朮

朝暮急者氣血俱虛宜雙補之

○一論腫脹之症因內傷而得者或誤服攻擊殺伐之過以致元氣脾胃虛損之極腫脹尤甚于前此氣血兩虛腎水乾涸用此方以金匱腎氣

九兼進

加味補中益氣湯

黃芪 炒二錢

人參 一錢

白朮 去鹽炒二錢

白茯苓 二錢 陳皮 八分

當歸 酒洗一錢

白芍 酒炒一錢五分 柴胡 四分

升麻 三分 蘿蔔子 炒一錢

厚朴 錢炒一錢

甘草 炙二分 枳實 錢炒五分

右判下劑生薑煎服

○一論脾腎虛。腰痠脚腫。小便不利。或肚腹脹痛。四肢浮腫。或喘急痰盛。已成蠱症。其効如神。此症多因脾胃虛弱。治失其宜。元氣復傷。而變症者。非此藥不能救。必以補中益氣湯。早晚兼服。可收全功矣。

金匱腎氣丸

懷熟地黃 兩四

白茯苓 三兩

牛膝 去鹽酒洗

肉桂

澤瀉

車前子

山茱萸 酒蒸去核

山藥

牡丹皮 各一兩 大附子 炮去皮脂五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心米飲送下臨卧服補中益氣湯

○一論單腹脹及脾虛腫滿脇間閉塞或胃口作痛此補中有消之意也調中健脾丸

黃芪

二兩

人參

二兩

白朮

去蘆黃土

白茯苓

二兩

陳皮

三兩

半夏

泡七次

蒼朮

米泔浸炒

香附

童便浸炒

白芍

五錢

黃連

吳茱萸煎水炒

蘇子

炒一兩

蘿蔔子

炒一兩

山查肉

炒二兩

薏苡仁

炒三兩

澤瀉

炒一兩

沉香

六錢

五加皮

炒二兩

草豆蔻

酒拌炒

法製瓜蒌

一兩

○用大瓜蒌二箇錢三孔每箇入川椒二錢多年者去藥二錢銀殼米炒大外用絹袋包裹入沸湯中煮三升入封固晒乾炭火烘燥紅取出去泥其黑色下并入藥

右為細末煎荷葉大腹皮湯打黃米糊為丸如梧子大每服百丸日進三服白湯送下

右方治氣水腫多，不便製子，每不用此味，亦神奇功，如有更妙。

○按右諸方治腫脹，屬虛皆宜用此。王道之劑，病者苦其脈腫難一堪，元令朝服九藥，夕服湯藥，或三朝五日，間服蟠桃丸，或石幹散，十服謂之下棋打劫，而治病者，暫據一時之寬，醫者一補一攻，亦善治之良法也。

○下人脾胃虛弱，肚腹鼓脹，遍身腫脹，按之成窠，其脈沉細，右寸為甚。此脾肺虛寒之症，治以八味丸，或金匱腎氣丸，以補腎陰，行生化之源，至暮服之，小便通，又數劑腫消，即止前藥，復與六君子湯，加水香、官桂、炮薑，以燥脾，導氣而瘥。後因不戒性，病復作，但有氣惱，或飲食稍多，即泄瀉，仍用八味丸倍附子。

○下儒者失於調養，飲食難化，胸膈不利，或用行氣消導藥，咳嗽喘促，服行氣化痰藥，肚腹漸脹，脈行氣分利，藥雖臥不能兩足，浮腫小便不利，大便不實，脈浮大，按之微細，兩寸皆短。此脾腎虧損，朝用補中益氣，加

薑附片用金匱腎氣加骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中八味半載而康。

補遺

蟾桃丸 韋國主秘傳治男婦渾身頭面手足浮腫肚腹脹滿疼痛上氣

喘急千金不傳之妙。

沉香三錢 木香三錢

乳香

三錢 著上名

沒藥

三錢 著上名

琥珀

一分 廣以

白丑

半用頭末八錢

黑丑

用牙皂煎濃九浸半日鋪底煨

檳榔

牙皂煎汁浸透焙熟

右為細末牙皂水打稀麵糊為丸如梧子大每服二錢七分五更侵晨

砂糖煎湯送下。

○張靜虛道人治蟲脹神方 薛其地傳

石幹散

石幹一錢

黑丑

一錢 頭末

沉香

五分

木香

五分

檳榔

一錢

葶藶八分

琥珀五分

海金沙一錢

右共爲末聽用患者先服五皮散一二帖然後服此末藥實者一錢虛者九分空心葱白湯下隔一日一服輕者二帖重者不過三帖全愈後服健脾養胃之藥永不發也服藥要忌葷葷腥二十七則腸胃清病根拔

○一治腫脹仙方名金粟兒

紅芽太戟一斤紅棗三斤水煮下日夜去大戟用棗晒乾食之立消

○一治水腫黑豆煮去皮焙乾爲末每二錢米飲調服

○一治腫脹仙方名天命飲

白商陸根似人形者搗取汁一合生薑自然汁二合點黃酒一盞和服空心三日服一次元氣厚者服五次薄者三次止忌鹽醬凡入午五十以裏者可服五十以外者不必用

○一治腫用

粟米菴豆各一抄猪肝一葉切碎三味煮作粥食之至重者不過五

次其腫自消。切忌氣惱生冷之物。

○一治十腫水病不瘥垂死者。

用青頭雄鴨一隻。治如食法。細切和米并五味煮極熟化粥食之。

○一方用鯉魚一尾重一斤和冬瓜葱白煮食之。

○一方向用瀨蝦蟇一箇入猪肚內煮熟去蝦蟇將肚一日俱食盡。

○一治蠱腫。

用田螺不拘多少。水漂加香油一盞于水內。其涎自然吐出。取其涎曬乾爲末。每服不過三分酒調下。其水自小便而下。其氣自大便而出。其腫即消。即服養脾胃之藥爲妙。

○一治水氣腫滿腹脹者。

用黑白牽牛頭末每服二錢。太麥麴三錢。水和爲餅。以火煨熟取出。食之。茶湯送下。太小便利後灸臍上一寸。臍下一寸半。各一七壯。効。

○一治十腫蠱脹輕者服此立効。



苦丁香去梗微焙爲末用棗肉爲丸如梧子大每服三十丸空心米湯下行水日進二服

○一治十腫水氣五蠱脹氣其効如神一人患腹脹陰囊腫大不下刺而病愈真仙方也

甘遂赤皮細花不蛀者不爲多用蕎麥麵水和作厚餅內抄神麴末將餅厚包甘遂在內灰火中燒熟取出晒乾爲末每用一錢二分以細麵約一兩許合和水調趕作麵片次用商陸二錢半巴豆一箇去殼水一碗半砂鍋內煎至一碗去渣再入鉄鍋內入煎麵片煮熟食之其商陸湯任其意服與不服不在其限服不二時水從大便出如見血蠱即下血氣蠱即氣下當時腫消若有喘嗽盡皆安貼若腹中塊澀消散只一服見効忌鹽醬冬瓜香油蠶腥之物半月後用鹽亦須炒過用之若蠱症加胡椒一錢與巴豆同煮其巴豆須看虛實加減其壯者加至二三箇無妨

# 積聚

脉來實強者生沉小者死。○脉來沉者積也。在寸口積在胸中。在關上積在臍脘。在尺部積在少腹。脉在左積在左。脉在右積在右。脉在中央。○脉來小沉而實者。臍中有所積聚。不下食。食則吐。

積者生於五臟之陰也。其發有根。其痛有常處。脉必結伏。緊者成於六腑之陽也。其發無根。其痛無常處。脉必浮結。由陰陽不和。臟腑虛弱。以氣七情失常。所以為積聚。血久則為癥瘕。成塊不能移動者。是癥也。或無或上或下。或左或右。按之痕氣不能成塊。塊乃有形之物。血積死血。此理顯然。在中為痰飲。右為食積。左為死血。太法破以無。以劑之行氣開痰為要。積塊不可專用下藥。徒損其氣。動亦不。使之溶化。其死血塊去。須太補。痞塊在皮裏膜外。須用補藥。其六君子湯加香附枳實開之。

○一論五積六聚癥瘕痞癖飲食積死血成塊也  
化堅湯

白朮去蘆

白茯苓去皮 當歸酒洗

川芎

香附炒

山楂

枳實麩炒

陳皮

半夏姜炒

桃仁去皮尖

紅花

莪朮煨

甘草

右劉蒯生薑三片水煎溫服○肉積加黃連○麩積加神麴○左有塊倍川芎○右有塊加青皮○飽脹加蘿蔔子○壯人加三稜○弱人加人參

○一論五積六聚痰積血積食積氣積一切積塊或中或左或右或上或下久不愈者用此

消積保中丹

陳皮去白

半夏湯泡切片

白茯苓去皮

白朮去蘆炒

香附醋炒

青皮去核

木香三錢不

檳榔七錢

莪朮

醋炒八錢

三稜

醋炒八錢

萊菔子

炒一兩

砂仁

炒四錢

神麴

炒一兩

麥芽

炒六錢

白芥子

炒一兩

黃連

姜汁炒

梔子仁

姜汁炒一兩

槐仁

去皮尖

紅花

五錢

當歸

酒洗一兩

川芎

八錢

直阿魏

醋浸五錢

乾漆

炒煙五錢

右為細末

薑汁酒打稀糊為丸

如梧子大

每服八十丸

食後白湯送下

體虛人加入參

丁兩外

宜化鐵膏貼之

○一論五積六聚

狀如癥瘕

隨氣上下

發作有時

心腹疼痛

上氣室塞

小腹脹滿

大小便不利

宜以

大七氣湯

三稜

莪朮

香附

肉桂

甘草

青皮

陳皮

桔梗

藿香

益智

右剉剉生薑三片

棗子一枚

水煎溫服

查再煎服

○心脾痛加烏藥枳

殼

殼

○一論心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣癰癥積塊化痰飲宜胸腹順氣進食消脹軟堅用此

三稜煎丸

三稜生細對半片搗為末以酒三升升于砂鍋內慢火熬成膏青皮去穢二兩羅蔔子炒二兩

神麴炒二兩麥芽炒三兩乾漆炒三兩杏仁湯泡去皮尖炒黃色三兩

礞砂用磁盆細研入水調坐于灰火上候水乾取出為末

右為細末三稜膏為丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸食遠米

飲送下

○一論男婦五積六聚七癥八瘕破下切血下下切氣宜

消癥破積丸

三稜煨大黃煨乾漆炒去烟礞砂入醋煎乾巴豆去油各

右為末醋糊為丸如粟豆大每服三丸至七丸空心米湯送下量虛實

加減服之不可過服損人之真氣

○一論癥積心腹內結一塊如拳漸上撞心及腹脹痛

保安丸

大黃 三兩酒浸

乾薑 炮一兩

大附子 炮去皮臍五錢

鼈甲 醋煮一伏時炙

右為末陳米醋下升煮去四五合和藥為丸如梧桐子大每服二十丸

五更醋湯下天明時再服五丸取積如魚腸膿血爛泥而下

○一論虛弱之人腹中積聚癥塊脹滿疼痛面黃肌瘦肚大青筋不思飲食此藥消痰利氣扶脾助胃開胸快膈消痞除脹清熱消食久服積塊

漸消大効

加味保和丸

白木 去蘆炒

枳實 麩炒

陳皮 去白

半夏 泡姜炒

白茯苓 去皮

蒼朮 米泔浸

川厚朴 姜炒

香附 酒炒

神麴 炒

山楂肉 三兩

蘿蔔子 炒

連翹 二兩

黃連

酒炒一兩

黃芩

酒炒一兩

麥芽

炒一兩

三稜

醋炒一兩

莪朮

醋炒一兩

木香

五錢

右為細末，薑汁糊為丸，如梧子大，每服五十丸，加至七八十丸，食後白湯送下。

○一論五積六聚七癥八瘕，或左或右，或上或下，或腹中有時攻作疼痛，諸醫誤治，以致面黃肌瘦，四肢困倦，不思飲食，諸症宜以此方久服，則元氣漸復，脾胃漸壯，蓋養正積自除，譬如滿座皆君子，縱有一小人自無容地而出，此潔古之言，豈欺我哉。

加減補中益氣湯

黃芪

蜜水炒一錢五分

人參

一錢

白朮

去蘆炒一錢五分

白茯苓

去皮一錢

陳皮

七分

柴胡

五分

當歸

酒洗一錢

半夏

泡姜汁炒七分

山查肉

五分

枳實

麸炒五分

厚朴

姜炒七分

甘草

炙四分

右剉一剉，生薑三片，棗一枚，水煎，溫服，與前加味保和丸兼而服之，久

則病根自拔

○按右諸方虛弱人患積塊久不愈者宜化鐵膏

肥皂

四兩

生薑

四兩

葱

半斤

蒜

半斤

皮硝

半斤化水

大黃末

四兩

入膏

再熬

貼塊上

內服

前保中丸

○一治痞塊心下堅硬狀若覆杯者服此一料即愈

三棱

莪木

檳榔

草果

陳皮

枳殼

山查

各二兩

小茴

甘草

各一兩

砂仁

木香

浮鐵皮

各五錢

厚朴

姜炒

蒼朮

各四兩

沉香

三錢

枳實

一兩

神麴

酒炒

麥芽

炒

青皮

各二兩

右爲末酒糊爲丸如梧子大每服十五丸薑湯下

○一治痰塊痞塊血塊氣塊不拘冷熱諸塊皆效

莪木

二兩

麥芽

二兩

神麴

二兩

鼈甲

二兩

山查

二兩



青皮 二兩 砂仁 一兩 枳實 一兩 香附 二兩 巴豆仁 一兩 不

右巴豆仁同我木香附將米浸煮丁晝夜去豆不用炒乾為末將打米

糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心酒送下如婦人腹內血塊氣塊

作痛加紅花酒炒一兩當歸一兩荔枝核一兩烏藥一兩官桂五錢如

痰塊加陳皮一兩半夏曲一兩

○一治腹中痞氣兩脇痞積血塊痰積等症。

琥珀 二兩 阿魏 二兩 五錢 綿帛包

青皮 四兩 三稜 二兩 取前青皮同三稜共一處炒乾之

赤藥子 三兩 黃連 二兩 內一兩用吳茱萸一兩酒浸同

片苓 二兩 辰砂 三錢 炭火炒

陳皮 二兩 枳實 五錢 白豆蔻 二兩 甘草節 五錢

瓜蒌仁 二兩 沉香 八錢

右為末神麴二斤打糊為丸如梧桐子大每服五十一丸食遠白湯送

下

○一治諸氣食積及噎膈痞滿胸脇刺痛癥瘕疝氣並治  
神仙一塊氣

青皮

陳皮

三稜

莪朮

香附重便炒  
各一兩

神麴

麥芽

蘿蔔子

白丑

頭末

檳榔

鬱金

黃連

各五錢

枳實三錢

皂角

二錢半

百草霜

二錢半

右為細末麵糊為丸如棗豆大每服三五十丸視疾上下為食之先後  
熱酒薑湯任下

○一中洲吳仰泉夫人年五旬患腹中積塊如盤大腹脹年餘後漸膨不  
倒床腹竊如雷噤氣不透口乾吐白沫下氣通則腹中稍寬五心煩熱  
不思飲食肌瘦如柴醫者八人並無寸效丁家哭泣後事俱備束手待  
斃而已召余至診六部脈數氣口緊盛余知是前醫誤以寒涼殺伐之  
過使真氣不運而瘀血不行予以八物湯加半夏陳皮木香厚朴羅蔔

子大腹皮海金沙服三劑後小使下血塊如雞肝狀服至十二劑打下  
黑血塊盆許腹中仍有塊又以人參湯加枳實香附五劑而痊正足  
養正而積自除也信哉不誣

○一人腹中積塊面黃肌瘦腹大如鼓死在旦夕  
用端午日收下菖蒲陰乾切薄片放碗內用滾米湯泡熟盡之待溫  
飲之打下小蜈蚣百條內一太條長二尺餘病即愈

補遺

○一貼瘡妙方

照磨陳拓所傳

甘草五錢

甘遂五錢

硃砂五錢

沒藥五錢

葱白七寸

白蜜一小盞

右用馬齒莧同鱉肉搗成膏貼塊上効

○一千金貼瘡膏

薛英巡傳

黃丹

十兩水飛七次炒紫色

阿魏三錢

乳香三錢

沒藥五錢

當歸三錢

兩頭尖五錢

白芷五錢

川山甲十片

木鼈子十箇

麝香一錢

右俱爲細末用香油一斤槐花柳桑榆各二尺四寸巴豆一百二十箇  
去油殼車麻子丁百二十箇去殼先將鐵鍋盛油炭火煎滾入巴豆車  
麻在內熬焦撈去渣次下前藥用桃柳等條不住手攪均稠然後下丹  
滴水成珠爲度磁器收貯一男子腹內有痞者先以溫熱好醋將背上  
洗淨量所患大小用麵團圍定用皮硝一升放入麵團內鋪定用布蓋  
硝上發斗盛火不住手熨俟硝化盡再用溫醋洗去用紅絹攤膏貼於  
患處用舊布鞋底炙熱熨兩三時每七日一換貼藥重者不過三七腫  
血化去一小兒幼女患者臘醋熬硝洗之用紅絹攤膏貼患處下人  
將小兒雙手抱住在肩上用木鼈子搗爛搽於雙臂上後用布貼於  
鞋底屢之覺腹內木熱爲度

○一戴雷門夫人年近三旬患腹左有一大塊堅硬如石有時作痛肚腹

膨悶經水不調或前或後或多或少或閉而不通白帶頻下夜間發熱脉急數予以

千金化鐵丸

當歸酒洗一兩五錢

白芍酒炒一兩五錢

川芎七錢五分

懷生地黃酒洗一兩五錢

白朮去蘆炒一兩五錢

白茯苓去破一兩

陳皮去白一兩

青皮去穢七錢五分

半夏姜汁炒一兩

枳實錢七

木香二錢五分

香附炒一兩

檳榔五錢

蘿蔔子炒五錢

三稜醋炒一兩五錢

莪朮醋炒一兩五錢

桃仁去皮尖五錢

紅花五錢

乾漆炒五錢

硃砂煨過五錢

琥珀五錢

右為細末醋打麵糊為丸如梧子大每服三錢白湯送下早晚各進一服服盡藥其塊消經即調而後即孕生二女也

五疸

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治。大抵脉大者死微細者生無脉鼻氣冷者不治也。沉渴欲飲水小便不利者必發黃也。內經曰諸濕腫滿皆屬脾土。夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也。蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病是故有諸中者必形諸外其疾有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如金匱相似故曰治濕不利小便非其治也。又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便一法宜用使上下分消其濕則病無有不安者也。

○一論治腎疸目黃甚至短身俱黃小便赤澀者宜

腎疸湯

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各五分

白茯苓二分澤瀉三分

猪苓四分

白朮五分

蒼朮一錢

黃栢二分 人參三分 葛根五分 神麴炒六分 甘草三分

升麻一錢 右剉丁剉水煎稍熱服

○一論濕熱發黃汗黃尿赤及寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃小便不利不思飲食用

茯苓滲濕湯

猪苓 澤瀉 蒼朮泔浸 白茯苓 陳皮

枳實麩 黃連炒 黃芩 梔子 防己

茵陳 木通

右剉生薑三片水煎服○如飲食不思乃傷食加砂仁神麴炒麥芽炒各等分

○一論黃疸專屬濕熱益麴相似

茵陳五苓散

茵陳三錢 白朮一錢 赤茯苓一錢 猪苓一錢 澤瀉一錢

蒼朮一錢 山梔二錢 滑石二錢 官桂二分 甘草二分

右剉燉心水煎服

○一論五疸俱是脾胃濕熱相蒸以致遍身發黃如梔子水染者是也病  
涉日久醫誤以寒涼之過損傷元氣脾胃以致身體黑瘦四肢沉困  
寒發熱不思飲食等症宜以  
加味益氣湯

黃芪錢五分 人參一錢 白朮去蘆炒 陳皮八分 當歸一錢  
柴胡五分 升麻五分 茵陳 蒼朮米泔浸 梔子炒  
猪苓 澤瀉 赤茯苓 黃連 滑石各一錢

甘草炙四分

右剉生薑煎服以六味地黃丸加蒼朮白朮茵陳黃柏各二兩金匱相  
兼而進之

一治發黃症身口俱發如黃色小便如濃菟相注諸藥不効用



加味解毒湯

黃芩

黃連

黃柏

梔子

柴胡

茵陳

龍膽草

木通

滑石

升麻

甘草

右剉燈心煎服。○太便實加大黃。○目睛黃信龍膽草

○一治發黃脉沉細而遲肢體逆冷腰已上自汗宜用

加味薑附湯

茵陳二兩

大附子一枚炙乾薑炮五錢一兩甘草炙一兩

右剉四劑水煎服。

○一治黃疸

安陵馬進孫傳秘方

露珠飲

露珠即土豆形如雞鵝爛取汁半碗湯服立效

○一治黃腫妙方

王少川傳

蒼朮一斤

廣陳皮半斤

川厚朴五兩

草果一兩

砂仁一兩

茵陳穗半斤

香附米一斤

青礬四兩

右青礬同附米炒燒過俱為細末醋打麴糊為丸如梧子大每空心酒下薑湯亦可

○一治黃疸病最捷用此

綠礬丸

五倍子

炒黑

綠礬汁炒白

針砂四兩醋

神麴半斤

右為細末薑汁煮紅棗肉為丸如梧子大每服六七十丸酒下不能飲酒米湯下終身忌食鹹麵

○一治黃胖飲食無味四肢無力行步倦怠脉滿而濡或腹有積塊脹滿加減胃苓湯

蒼朮

米泔浸

陳皮

厚朴姜炒

猪苓

澤瀉

白朮

去蘆炒

白茯苓

藿香

半夏

姜炒

大腹皮

山查

蘿蔔子

三稜

莪朮

青皮 去穢

甘草

右劉生薑三片，聚二十枚，水煎溫服。

○一治黃疸倦怠，脾胃不和，食少小便赤，宜以。

平胃散合五苓散加滑石。

○一治黃腫腹中有積塊，脹滿者用。

退金丹

山東李西嶺傳

蒼朮

酒炒

香附

八兩

青皮

去穢

陳皮

四兩

良薑

一兩

厚朴

姜炒

烏藥

四兩

三稜

煨一兩

莪朮

煨一兩

青礬

八兩用百  
草霜同炒

右為細末，醋糊為丸，如梧子大，每服五十丸，米湯送下。

○一治清道食疸，五積六聚，七癰八瘕，心腹疼痛，潮熱等症，不問大人小

兒皆可用此。

紫金丸

血竭 二兩

沉香 一兩

青皮 去穢

陳皮

厚朴 姜炒各二兩

枳殼 去穢炒 二兩半

秦艽 一兩

三棱 醋炒

蓬朮 醋炒各三兩

黃石 榴礬 二兩

香附 去毛 一兩

針砂 醋炒 一兩

黃石 榴礬 二兩

甘草 五錢

一方加仙朮白朮各一兩

攪揅 二兩

右為細末用大棗湯煮去皮核打糊為丸如梧子大每服六七十丸酒送下或米飲亦可

○一治遍身發黃妄言如狂苦於腹痛不可近此中焦畜血為患宜

桃仁承氣湯打下瘀血即愈

○一治黃病愛吃茶者用

白朮 去蘆炒

蒼朮 米泔浸

軟石膏 煨二兩 白芍 炒

黃芩 各一兩

薄荷葉 七錢

膽星

陳皮 各一兩

右為細末，砂糖水調神麴為丸。如梧子大，每服五六十丸，砂糖水下。

○一治黃病愛吃，厚泥者用。

黃泥一片

砂糖泥四兩和

右為細末，黃連膏為丸。如梧子大，每服五六十丸，空心糖湯下。

○一治黃病愛吃，生米者。

陳皮

白芍炒

神麴炒

麥芽炒

山楂

白茯苓

去皮石膏各一錢厚朴七分

蒼朮

分一錢二薑香五分

白朮

分一錢五甘草三分

右剉水煎熟，入砂糖一匙，蜋殼食前服。

○一治黃疸秘方

大蝦蟆一箇，黑礬三錢，猪肚一箇，上三味裝入肚內，煮爛，蝦蟆去，用煮湯洗，令肚淨，吃之即愈。

用煮湯洗，令肚淨，吃之即愈。

○一治女勞方

四苓散合四物湯去川芎加茵陳麥門冬滑石甘草

○一治諸黃疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此為虛症用八味丸方見補益用四君子湯吞下

○一治黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾糞使病用煎

猪脂一小升溫熱頓服之旦三次燥糞下去乃愈

新刊醫林狀元壽世保元丙集二卷